



開封口

省資源化のため、箱が添付文書を兼ねています。ご使用に際して、この箱の記載内容を必ず読んでください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第②類医薬品

〈外用痔疾用薬〉
販売名：ラホヤH軟膏EXα

▲ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください。
患部が化膿している人
2. 長期運用しないでください。

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください


関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
その他	刺激感、化膿

3. 10日間くらい使用しても症状がよくなるない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

[内容量] 20g

MADE IN JAPAN



A2404



痔の痛み・かゆみ・出血に

ステロイド外用剤

第②類医薬品

日本調剤企画

5COINS
PHARMA


8つの有効成分配合

痔の痛み かゆみ・出血に

ステロイド外用剤

プレドニゾン酢酸エステル配合

軟膏



20g

第②類医薬品

チューブの開け方



キャップを戻して薬に塗る

効能・効果

きれ痔(さげ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和及び消毒

用法・用量

1日1～3回、適量を肛門部に塗布してください。

用法・用量に関連する注意

(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(2) 肛門部のみ使用してください。(3) 用法・用量を厳守してください。

成分・分量 (100g中)

プレドニゾン酢酸エステル…0.1g、リドカイン…3.0g、イソプロピルメチルフェノール…0.1g、クロルフェニランマレイン酸塩…0.2g、アラントイン…1.0g、グリチルレチン酸…0.3g、トコフェロール酢酸エステル…3.0g、1-メントール…0.1g
添加物：マクロゴール、中鎖脂肪酸トリグリセリド、モノステアリン酸グリセリン、ソルビタンセスキエリン酸エステル、ワセリン

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であっても、なるべく速やかに使用してください。

1