

痔疾用薬 Anti hemorrhoids

第2類医薬品

販売名: **ラカナウH軟膏EX**

効果・効果: きれ痔(さげ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和  
及び消毒

用法・用量

1日1~3回、適量を肛門部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(2) 肛門部にのみ使用してください。(3) 定められた用法・用量を厳守してください。

省資源化のため箱が説明書を兼ねています。ご使用に際して、この箱の説明書を必ず読んでください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

成分・分量(100g中)

ヒドロコルチゾン酢酸エステル	0.5g
リドカイン	3.0g
酸化亜鉛	4.0g
イソプロピルメチルフェノール	0.1g
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.2g
アラントイン	1.0g
グリチルレチン酸	0.3g
トコフェロール酢酸エステル	3.0g

添加物として、マクロゴール、中鎖脂肪酸トリグリセリド、モノステアリン酸グリセリン、ソルビタンセスキオレイン酸エステル、ワセリンを含有します。

HapYcom

ハビコム

第2類医薬品

**ラカナウH軟膏EX**

1日1~3回、適量を肛門部に塗布してください。



くり返す肛門の  
かゆみ・痛みに

20g

△ 使用上の注意

× してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります) 1. 次の人は使用しないでください 患部が化膿している人。2. 長期使用しないでください

※ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください (1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
その他	刺激感、化膿

3. 10日間くらい使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)

開封口



ミックス  
パッケージ  
FSC® C003630



製造販売元 万協製薬株式会社  
三重県多気郡多気町五桂1169-142

万協製薬株式会社「お客様相談室」  
電話 0598-30-5376 受付時間 10:00~17:00  
(ただし、土、日、祝日は除きます。)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931



MADE IN JAPAN

使用期限

製造番号

