

販売名 コリサール内服液

服用に際しては、このラベルをお読みください。

△【使用上の注意】 ■ 相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
消化器	吐き気・嘔吐

2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 軟便、下痢 3.1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】●次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛・関節痛（腰痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、便秘、眼精疲労 ●脚気「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」●次の場合のビタミンB₁の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

【用法・用量】成人（15歳以上）1回1本（50mL）を1日2回服用してください。服用間隔は4時間以上おいてください。

副作用被害救済制度 電話 0120-149-931

製造販売元



中外医薬生産株式会社

三重県伊賀市ゆめが丘7-5-5

お客様相談室：0595-21-3200

受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

眼精疲労 **第3類医薬品**

肩こり・腰痛の緩和

コリサール

眼 肩 腰

肉体疲労時の
ビタミンB₁
補給に

50mL

ベンフォチアミン配合

【成分・分量】1日量
100mL(50mL×2本)中
ベンフォチアミン138mg、
オキソアミチン末(加工大
蒜)200mg、リボフラビン
リン酸エステルナトリウム
15mg、ピリドキシン塩酸塩
50mg、ニコチン酸アミド
60mg、アスパラギン酸カ
リウム・マグネシウム400mg
添加物：エド酸Ca/Na、
白糖、果糖、D-ソルビトール、
トメントール、クエン酸、d-リ
ンゴ酸、パラベン、塩酸、エ
タノール、プロピレングリコール、香料

【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

本剤は生薬成分を配合していますので、沈殿を生じることがあります。よく振ってから服用してください。

ガラス：ビン

O3CRELAJ

金属：キャップ

製造番号

使用期限

