

服用に際して、この添付文書をよくお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。

ビタミンC主薬製剤

第3類医薬品

ビタミンC錠〔TH〕

— 1日量ビタミンC 2000mg 含有 —



ビタミンCは体内で欠乏すると、貧血、食欲不振、疲れ、病気に対する抵抗力が低下するなど、体力保持のための必須のビタミンです。

しかも、ビタミンCは、食物から補給する以外に、人の体内で作り出すことができません。血行をよくし、しみ、そばかす、日やけ・かぶれにもよく効き、また、加齢による体力低下の回復などにも本剤をご愛用いただき、健康の維持、増進にお役立てください。



⚠ 使用上の注意

igy 相談すること

- 服用後、消化器に吐き気・嘔吐などの症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 服用後、下痢の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

● 成分・分量 6錠中

アスコルビン酸	1,400 mg	アスコルビン酸カルシウム
リボフラビン 酯酸エステル	6mg	(アスコルビン酸として600mg) 726mg

添加物として、乳糖水和物、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースカルシウム、ステアリン酸マグネシウム、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、グリチルリチン酸二カリウムを含みます。

● 用法・用量

15歳以上	1回 1~3錠	7歳以上11歳未満	1回 1錠
11歳以上15歳未満	1回 1~2錠	1日 2回	食後に服用してください。

（用法・用量に関する注意）

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

● 効能

次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着

次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻出血

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は医師、薬剤師又は歯科医師に相談すること。」

次の場合のビタミンCの補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- 外箱に表示した使用期限内に服用してください。

企画元：株式会社ツルハグループマーチャンダイジング

製造販売元 **米田薬品工業株式会社**

奈良県高市郡高取町市尾966



本品について
のお問い合わせ先

米田薬品工業株式会社

お客様相談室 TEL 0120-18-3548

月～金曜日（祝日を除く）10:00～16:00

副作用被害救済制度 TEL 0120-149-931

1907G