

ここからお切りください。

ビタミンC主薬製剤

開封後はチャックをしっかりと閉じて保管してください。

販売名：ホワイピュア EX 第3類医薬品

この説明書は服用前に必ずお読みください。

【使用上の注意】

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
(1) 医師の治療を受けている人。 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、胃部不快感、腹痛

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
下痢、便秘
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
5. 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがある。出血が長く続く場合は、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

【効能・効果】

- 次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着
- 次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻血
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談すること。」
- 次の場合のビタミンCの補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

【用法・用量】

次の1回量を1日2回服用してください。

年 齢	1 回 量
成人（15歳以上）	2錠
7歳以上 15歳未満	1錠
7歳未満	服用させないこと

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密封して保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります。）。
4. 湿気により錠剤の外観が変化するおそれがありますので、ぬれた手で触れないでください。
5. 袋の中に乾燥剤が入っています。服用しないでください。
6. 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【お問合せ先】

ジェイフロンティア株式会社 ☎0120-770-328 受付9：30～18：30（土日・祝日・年末年始を除く）

【発売元】

ジェイフロンティア株式会社 東京都渋谷区桜丘町9-8KN 渋谷3-4階

【製造販売元】

第一薬品工業株式会社 富山県富山市草島15-1

【成分・分量】 4錠(成人1日量)中

成 分	分 量
アスコルビン酸（ビタミンC）	1000mg
L-システイン	240mg
リボフラビン（ビタミンB ₂ ）	12mg
ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB ₆ ）	30mg
トコフェロールコハク酸エステルカルシウム （ビタミンEコハク酸エステルカルシウム） （dl-α-トコフェロールコハク酸エステルとして）	51.89mg 50mg
ニコチン酸アミド	30mg
パントテン酸カルシウム	30mg

添加物として、乳酸Ca、トウモロコシデンプン、セルロース、クロスボドン、ヒドロキシプロピルセルロース、アルファア化デンプン、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、酸化チタン、タルクを含有します。

<成分・分量に関連する注意>

- (1) 本剤の服用により、尿及び大便の検査値に影響を与えることがあります。これらの検査を受ける場合は、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師に知らせてください。
- (2) 本剤はリボフラビン(ビタミンB₂)を含有するため、本剤の服用により、尿が黄色くなる場合があります。

副作用被害救済制度
☎0120-149-931



4 580372 302743

SH-2



PE,M,PET

使用期限

製造番号

MADE IN JAPAN