

第3類医薬品



キメの乱れ・バリア機能の低下が気になる肌あれ・にきびに

# ビタミンB<sub>6</sub>主薬製剤 デュアタイム<sup>TM</sup>コーワ


**朝と夜、2種類の処方**で肌の生まれ変わりを助け  
**肌あれ・にきびなどの肌トラブルを改善**するお薬です。

デュアタイムコーワは、朝になると自然に目覚め、夜になると眠くなる、約24時間の体内リズム(サーカディアンリズム)に着目したビタミン剤です。バランスよく配合した5種類のビタミンに加え、「朝用」には紫外線などに対する抗酸化作用のあるビタミンEを、「夜用」には乾燥しがちな皮膚の保水に関与する生薬ヨクイニンを配合。朝と夜、きちんと服用することで、肌の生まれ変わりを助けて肌あれ・にきびなどを改善します。

### 健やかな肌のために

肌あれ・にきびなどの肌トラブルは、食生活の乱れなどからくるビタミン不足のほか、生活のリズム、季節の変化、生理周期など、さまざまなリズムが影響していると言われています。

規則正しい生活リズムと、デュアタイムコーワの朝と夜の正しい服用をおすすめします。



## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
消化器	吐き気・嘔吐

2.服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
下痢

3.1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 効能・効果

・次の諸症状の緩和:肌あれ、にきび、口内炎、口角炎、口唇炎、舌炎、湿疹、皮膚炎、かぶれ、ただれ、手足のしびれ

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談してください。」

・次の場合のビタミンB<sub>6</sub>の補給:妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時



## 用法・用量

下記の量を水又は温湯で服用してください。

年 齢	1回量		1日服用回数
	朝(黄色錠)	夜(白色錠)	
成人(15歳以上)	3錠	3錠	2回(朝1回、夜1回)
15歳未満の小児	服用しないこと		

### <用法・用量に関連する注意>

黄色錠と白色錠で成分が異なります。用法・用量を厳守してください。

## 成分・分量：6錠(黄色の朝用3錠、白色の夜用3錠)中

成 分	分 量		働 き
	朝用(黄色錠)	夜用(白色錠)	
ピリドキシン塩酸塩(V.B <sub>6</sub> )	50.0mg	50.0mg	皮膚や粘膜の正常な働きを助けるとともに、脂質・たんぱく質の代謝を正常化し、肌の新陳代謝を促します。
リボフラビン(V.B <sub>2</sub> )	6.0mg	6.0mg	
アスコルビン酸(V.C)	250.0mg	250.0mg	皮膚や粘膜の正常な働きを助けるビタミンです。
ニコチン酸アミド	20.0mg	20.0mg	
パントテン酸カルシウム	10.0mg	10.0mg	
コハク酸d-α-トコフェロール(V.E)	20.0mg	—	抗酸化作用により体内の脂質を酸化から守り、細胞の正常な働きを助けます。
ヨクイニンエキス(ヨクイニンとして)	—	160.0mg(2080mg)	皮膚の保水に関与し、肌あれ・にきびを改善する働きがある生薬です。

[添加物]乳酸Ca、乳糖、セルロース、無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、カラメル、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、タルク、酸化チタン、三二酸化鉄

### <成分・分量に関連する注意>

本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、ビタミンB<sub>2</sub>(リボフラビン)によるものですから心配ありません。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 高温をさげ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 水分が錠剤につくと、内容成分の変化のもととなりますので、水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。誤って錠剤をぬらした場合は、ぬれた錠剤を廃棄してください。
- (5) 容器のキャップのしめ方が不十分な場合、湿気などにより、品質に影響を与える場合がありますので、服用のつどキャップをよくしめてください。
- (6) 使用期限(外箱に記載)をすぎた製品は服用しないでください。



本製品に関するお問い合わせは、お買い求めのお店又は  
 興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センターへお願いします。  
 〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14  
 TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566  
 電話受付時間:月～金(祝日を除く)9:00～17:00



**Kowa** 発売元 興和株式会社 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14  
 製造販売元 日東薬品工業株式会社 京都府向日市上植野町南開35-3