

この説明書は本剤とともに保管し、服用に際しては必ずお読み下さい。

ビタミンEC 主薬製剤

ビタミンC 主薬製剤

ビタミンB2 B6 顆粒S

第3類医薬品

□製品の特徴

- 末梢の血液循環を促進させます。
末梢血管の血流を促進し、血行障害による症状(肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ)をやわらげます。
- 体内の過酸化脂質の増加を防ぎます。
ビタミンEは、血管壁や血液中の過酸化脂質(変質した脂肪)の増加を防ぎ、体内脂肪を安定に保ちます。
- 血管壁を強くします。
毛細血管を丈夫にし、歯ぐきからの出血や鼻出血を予防します。
- しみや日やけなどによる色素沈着を防ぎます。
ビタミンCは、しみや日やけなどの色素の沈着を防ぐ働きがあります。
- 効力のすぐれた成分を配合しています。
植物油より抽出、精製、安定化した天然型ビタミンE(酢酸d- α -トコフェロール)は体内での効力がすぐれています。ビタミンB₂酪酸エステル(リボフラビン酪酸エステル)は、従来のビタミンB₂(リボフラビン)より体内での持続性にすぐれており、また血中の脂質代謝にも関与しています。

⚠ 使用上の注意

【相談すること】

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3) 次の診断を受けた人:フェニルケトン尿症
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、胃部不快感、胃部膨満感、食欲不振

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
便秘、下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
5. 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、医師、薬剤師、又は登録販売者に相談して下さい

【効能効果】

- 末梢血行障害による次の諸症状の緩和:肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ
- 次の諸症状の緩和:しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着
- 次の場合の出血予防:歯ぐきからの出血、鼻出血
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善が見られない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談して下さい。」
- 次の場合のビタミンECの補給:肉体疲労時、病中病後の体力低下時、老年期

【用法・用量】

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	1 包	1～3回
11才以上15才未満	2/3包	
7才以上11才未満	1/2包	
3才以上 7才未満	1/3包	
1才以上 3才未満	1/4包	
1才未満	服用しないこと	

1日2回服用する場合は朝夕、3回服用する場合は朝昼晩に服用する。
ただし、1日2回服用する場合は6時間以上の間隔をおき、1日3回服用する場合は4時間以上の間隔をおき服用して下さい。

〈用法・用量に関連する注意〉

(1) 用法用量をお守り下さい。

(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

【成分分量】

3包（成人1日量）中、次の有効成分を含有します。

成 分	含 有
酢酸d- α -トコフェロール（天然型ビタミンE）	300mg
アスコルビン酸（ビタミンC）	2000mg
リボフラビン酪酸エステル（ビタミンB ₂ 酪酸エステル）	12mg
ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB ₆ ）	50mg
ニコチン酸アミド	60mg

添加物として粉末還元麦芽糖水アメ、白糖、デキストリン、エリスリトール、第三リン酸カルシウム、プルラン、アスパルテーム（L-フェニルアラニン化合物）、酒石酸、香料、トコフェロール、L-メントールを含有します。

〈成分分量に関連する注意〉

(1) 本剤の服用により、尿及び大便の検査値に影響を与えることがあります。尿及び大便の検査を受ける場合、及び医師の治療を受ける場合は、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師に知らせて下さい。

(2) 本剤に配合されているリボフラビン酪酸エステルにより、尿が黄色になることがあります。

【保管及び取り扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。

(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。

(3) 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります。）

(4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。なお、使用期限内であっても、なるべく早く服用して下さい。（品質保持のため。）

(5) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。

(6) 箱の開封年月日記入欄に、開封日を記入して下さい。

包装単位 20包（1包2g入り）、100包（1包2g入り）

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

（独）医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/>

☎0120-149-931（フリーダイヤル）

■お問い合わせ先

備前化成株式会社 お客様相談窓口


☎0120-330-476（フリーダイヤル）

受付時間9:00～17:00（土日祝祭日を除く）

販売者

 サンドラッググループ

製造販売元

 備前化成株式会社
BIZEN 岡山県赤磐市徳富363