

開封後はチャックを閉めて保管してください。

チャック

服用に際しては、この説明文を必ずお読みください。

販売名：コングルコン 55

第3類医薬品 ビタミンB₁、B₆、B₁₂製剤

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- | 関係部位 | 症状 |
|------|------------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 吐き気・嘔吐、口内炎、胃部不快感 |
- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
便秘、軟便、下痢
 - 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

使用
期限
製造
番号

【内容量】 93錠

【成分・分量】 3錠 (1日最大服用量) 中

フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB₁誘導体) 109.16mg (フルスルチアミンとして100mg)、トコフェロールコハク酸エステルカルシウム(ビタミンE) 103.58mg (dl- α -トコフェロールコハク酸エステルとして100mg)、ガンマーオリザノール10mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆) 100mg、シアノコバラミン(ビタミンB₁₂) 1,500 μ g、パントテン酸カルシウム30mg
添加物として、乳酸Ca水和物、カルメロースCa、セルロース、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、乳糖水和物、ヒプロメロース、白糖、ゼラチン、アラビアゴム、炭酸Ca、タルク、酸化チタン、リポフラビン、カルナウバロウを含有します。

【効能】

- 次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛、関節痛(肩・腰・肘・膝痛、肩こり、五十肩など)、手足のしびれ、眼精疲労(慢性的な目の疲れ及びそれに伴う目のかすみ・目の奥の痛み)
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」
- 次の場合のビタミンB₁B₆B₁₂の補給：肉体的疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

【用法・用量】

成人(15歳以上) 1日1回2~3錠
1日1回食後に水またはお湯でかまわずに服用してください。15歳未満は、服用しないでください。
<用法・用量に関連する注意>用法・用量を厳守してください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密封して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 湿気などの影響により本剤が変質するおそれがありますので、服用後はそのつど必ずチャックをしっかり閉めてください。
- (5) めれた手で触れないでください。水分が錠剤につくと、表面が一部溶けて、変色又は色おらを生じることがあります。また、めれた錠剤を袋に戻すと他の錠剤にも影響を与えますので、戻さないでください。
- (6) 袋の中に乾燥剤が入っています。服用しないでください。
- (7) 使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。
- (8) 使用期限内であっても、品質保持の点から開封日より6ヵ月以内に服用してください。

製造販売元
米田薬品工業株式会社
奈良県高市郡高取町市尾986



2308A 7187199-A

お問い合わせ先
株式会社東京ディベロ
電話 0120-107-111
受付時間 9:00~18:00
(日祝、年末年始を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931