



目の疲れ・肩こり
腰痛に

EX+α
クレマエースEXP^α
300錠 第3類医薬品

- ビンの中詰め物は錠剤の破損防止用です。開封時に捨ててください。
- 錠剤は濡れた手で扱わないでください。

第3類医薬品 300錠

ビタミン
B1・B6・B12・E

EX+α
KUREMA ACE EXP^α

ニコチン酸アミド
(ビタミンB₃)



クレマエースEXP^α

第3類医薬品 300錠

ビタミン
B1・B6・B12・E

EX+α
KUREMA ACE EXP^α

ニコチン酸アミド
(ビタミンB₃)



クレマエースEXP^α

目の疲れ・肩こり・腰痛に

目の疲れ・肩こり・腰痛に

開封年月日を
記入してください。

開封口

販売名：クレマエースEXP^α 第3類医薬品
ビタミンB₁・B₆・B₁₂主製剤

服用の際は、この説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

使用上の注意

- 【相談すること】
1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、口内炎、胃部不快感

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 軟便、下痢、便秘
4. 1か月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
5. 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この説明文を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】
次の諸症状の緩和、神経痛、筋肉痛、関節痛(肩・腰・肘・膝痛、肩こり、五十肩など)、手足のしびれ、眼精疲労(慢性的な目の疲れ及びそれに伴う目のかすみ、目の奥の痛み)
【ただし、これらの症状について、1か月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。】
次の場合のビタミンB₁B₆B₁₂の補給：肉体的疲労時、妊娠・授乳期、病中・病後の体力低下時

【用法・用量】
次の量を水またはぬるま湯で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2～3錠	1回
7歳以上15歳未満	1錠	
7歳未満	服用しないでください	

<用法・用量に関連する注意>
(1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
(2) 定められた用法・用量を厳守してください。

【成分・分量】3錠(1日最大服用量)中
シアノコバラミン(ビタミンB₁₂) 1,500µg
フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB₁誘導体) 109.16mg
(フルスルチアミンとして100mg)
ピドキシニン塩酸塩(ビタミンB₆) 100mg
トコフェロールコハク酸エステルカルシウム(ビタミンE) 103.58mg
(トコフェロールコハク酸エステルとして100mg)
パントテン酸カルシウム 30mg
ガンマオリザノール 10mg
ニコチン酸アミド(ビタミンB₃) 60mg
添加物としてセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、無水ケイ酸、乳糖水和物、パレオシトラン、乳酸Ca水和物、クロスカルメロースNa、ステアリン酸Mg、アラビアゴム末、酸化チタン、タルク、白糖、ヒプロメロース、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、カルナウバロウ、リポフランリン酸エステルNaを含有する。

- 【保管及び取扱い上の注意】
- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
 - (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
 - (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になり品質が変わることがあります)
 - (4) ビンの中詰め物は、開封後に捨ててください。詰め物を捨てたのは、落下等の衝撃で錠剤破損(糖衣層の欠け)が生じることがありますので、取り扱いは注意してください。(詰め物は、錠剤が輸送中に破損するのを防止するためのものです)
 - (5) ビンの中の包装紙に包まれた平型錠は乾燥剤です。食べないでください。
 - (6) 服用の都度ビンのカップをしっかり開けてください。(吸湿すると品質が変わることがあります)
 - (7) 錠剤は濡れた手で扱わないでください。(糖衣層がはげたり変色の原因となります)
 - (8) 使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。
 - (9) 開封後は、品質を保つ意味で開封日から6か月以内の服用を目安にしてください。

発売元：オール薬品工業株式会社
〒661-0953 兵庫県尼崎市東園田町2丁目106番地
製造販売元：寧薬化学工業株式会社
〒635-0035 奈良県大和高田市旭南町2番25号

お問い合わせ 寧薬化学工業株式会社
相談窓口 ☎ 0745-22-4151
受付時間 9:00～16:00(土日祝を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話：0120-149-931(フリーダイヤル)

MADE IN JAPAN

AS6625240110

使用期限

製造番号



C022