

〔使用上の注意〕

〔相談すること〕

しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〔効能・効果〕

滋養強壮・虚弱体質・肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

〔用法・用量〕

成人(15歳以上)

1回1瓶(100mL)

1日1回服用してください。

●15歳未満は服用しないでください。

●用法・用量を厳守してください。

副作用救済制度 ☎0120-149-931

ガラス:瓶

金属:キャップ

SANRIKISO Z3000II

滋養強壮・肉体疲労時などの栄養補給

サンリキソZ3000II



アミノ酸配合

第3類医薬品

100mL

〔成分・分量〕1日量1瓶(100mL)中 登録品目番号24-467

ゴウウ浸出液5mg(ゴウウ0.5mgに相当)、
ローヤルゼリーチンキ50mg(ローヤルゼリー
50mgに相当)、チアミン硝酸化物10mg、リボ
フラビンリン酸エステルナトリウム5mg、ピ
リドキシン塩酸塩12mg、ニコチン酸アミド
30mg、無水カフェイン50mg、タウリン3000mg、
アスパラギン酸カリウム・マグネシウム等
量混合物200mg、カルニチン塩化物100mg、
L-バリン60mg、L-ロイシン120mg、L-イソ
ロイシン60mg、L-アルギニン塩酸塩60mg
(アルコール0.2mL以下)

添加物として、白糖、D-ソルビトール、ス
クラロース、DL-リンゴ酸、カラメル、安息
香酸Na、パラベン、ポリリン酸Na、pH調
整剤、エタノール、グリセリン、香料を含有
する。

●本剤に含まれるビタミンB2により、尿が黄色
になることがあります。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保
管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

製造販売元 株式会社廣貴堂

富山市梅沢町2丁目9-1

(お客様相談窓口)電話076-424-2259

1瓶(100mL)中74.6kcal

使用
期限

製造
記号



4

販売名:サンリキソZ3000II

【使用上の注意】

【相談すること】

しばらく服用しても症状がよくなる
ない場合は服用を中止し、この
製品を持って医師、薬剤師
又は登録販売者に相談してく
ださい。

【効能・効果】

滋養強壮・虚弱体質・肉体疲労・
病中病後・食欲不振・栄養障害・
発熱性消耗性疾患・産前産後
などの場合の栄養補給

【用法・用量】

成人(15歳以上)1回1瓶(100mL)
1日1回服用してください。

- 15歳未満は服用しないでください。
- 用法・用量を厳守してください。

製造販売元 株式会社廣貴堂
富山県富山市梅沢町2丁目9-1
(お客様相談窓口)電話076-424-2259

ガラス:瓶
金属:キャップ

71A1

共創未来

3000

タウリン+アミノ酸成分+生薬成分

滋養強壮
虚弱体質
栄養補給

サンリキソ
Z3000II

第3類医薬品



【成分・分量】1日量1瓶(100mL)中

ゴオウ浸出液5mg(ゴオウ0.5mgに相当)、
ローヤルゼリーチンキ50mg(ローヤルゼリー
50mgに相当)、チアミン硝酸化物10mg、リボ
フラビンリン酸エステルナトリウム5mg、ピ
リドキシン塩酸塩12mg、ニコチン酸アミド
30mg、無水カフェイン50mg、タウリン3000mg、
アスパラギン酸カリウム・マグネシウム等
量混合物200mg、カルニチン塩化物100mg、
L-バリン60mg、L-ロイシン120mg、L-イソ
ロイシン60mg、L-アルギニン塩酸塩60mg
(アルコール0.2mL以下)

添加物として、白糖、D-ソルビトール、ス
クラロース、DL-リンゴ酸、カラメル、安息
香酸Na、パラベン、ポリリン酸Na、pH調
整剤、エタノール、グリセリン、香料を含有
する。

●本剤に含まれるビタミンB2により、尿が黄色
になることがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

副作用救済制度 ☎0120-149-931

使用
期限

製造
記号



4 954097 870779