

使用上の注意 相談すること

しばらく服用しても症状がよくなる場合
は服用を中止し、この製品を持って医
師、薬剤師又は登録販売者に相談してく
ださい。

効能・効果

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・
食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・
産前産後などの場合の栄養補給

用法・用量

用法・用量を厳守してください

成人(15歳以上) 1日1回 1回1瓶(100mL)

15歳未満は服用しないでください

保管及び取扱い上の注意

1.直射日光の当たらない涼しい所に保管し
てください。2.小児の手のとどかない所に
保管してください。3.他の容器に入れ替え
ないでください。(誤用の原因になったり、
品質が変わります)4.使用期限を過ぎた製
品は使用しないでください。

副作用被害救済制度 ☎0120(149)931

製造販売元 株式会社廣貴堂
富山市梅沢町2丁目9-1
(お客様相談窓口) 電話076-424-2259
月～金 9:00～17:00 (祝日を除く)

ガラス：瓶、金属：キャップ 07A1

HapYcom

マージョンDX4000α

4000α

タウリン3000mg アミノ酸類※1000mg
3種類の生薬成分

滋養強壮・虚弱体質
肉体疲労時の栄養補給

第2類医薬品

100mL

成分・分量 1日量1瓶(100mL)中

インヨウカク流エキス0.1mL(インヨウカク100mgに相当)、
ショウキョウエキス9.7mg(ショウキョウ100mgに相当)、ロー
ヤルゼリーチンキ50mg(ローヤルゼリー50mgに相当)、チア
ミン硝化物10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム
5mg、ピリドキシン塩酸塩5mg、ニコチン酸アミド30mg、無
水カフェイン50mg、タウリン3000
mg、アスパラギン酸カリウム・マグネシ
ウム等量混合物200mg、カルニチン塩
化物60mg、グリシン240mg、L-リシン
塩酸塩300mg、L-アルギニン塩酸塩
60mg、L-バリン35mg、L-ロイシン
70mg、L-イソロイシン35mg

添加物：白糖、D-ソルビトール、果糖
ブドウ糖液糖、デキストリン、シクロデ
キストリン、スクラロース、カラメル、ク
エン酸水和物、DL-リンゴ酸、ポリリン
酸Na、安息香酸Na、パラベン、pH調
整剤、エタノール、グリセリン、プロピレ
ングリコール、バニリン、エチルバニリ
ン、トコフェロール、香料
●本剤に含まれているリボフラビンリン
酸エステルナトリウムにより、尿が黄色く
なることがあります。●本剤は生薬成分
を含むため、まれに沈殿を生じることが
ありますが、薬効には変わりありません。

1瓶(100mL)あたり 80kcal

※アミノ酸類(L-バリン/L-ロイシン/L-
イソロイシン/L-アルギニン塩酸塩/ア
スパラギン酸カリウム・マグネシウム等
量混合物/カルニチン塩化物/L-リシン
塩酸塩/グリシン)

使用
期限

製造
記号



4

MADE IN JAPAN