

販売名：チオビタゴールド



**使用上の注意**

**相談すること**

1.服用後、下痢があらわれることがあるので、下痢の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。  
2.しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

**効能・効果**

■発熱性消耗性疾患・  
肉体疲労・病中病後・  
食欲不振・栄養障害・  
産前産後などの場合の  
栄養補給 ■滋養強壮  
■虚弱体質

**用法・用量**

成人(15歳以上)は、  
1日1回1本(30mL)  
を服用して下さい。  
●小児(15歳未満)は  
服用しないで下さい。  
●用法・用量を守って  
下さい。

製造販売元



**大鵬薬品工業株式会社**

東京都千代田区神田錦町1-27  
お客様相談室 TEL.0120-4527-66  
<https://www.taiho.co.jp/>

滋養強壮・虚弱体質・栄養補給に

**チオビタ<sup>®</sup>  
ゴールド**

**TIOVITA  
GOLD**

**第2類医薬品**

**成分** — 1本(30mL)中 —

ローヤルゼリー 100mg、ニンジン流エキス 0.6mL  
(原生薬 600mgに相当)、インヨウカク流エキス  
0.1mL(原生薬 100mgに相当)、チアミン硝化物  
(ビタミンB<sub>1</sub>) 5mg、リボフラビンリン酸エステルナトリ  
ウム(ビタミンB<sub>2</sub>) 5mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミン  
B<sub>6</sub>) 5mg、ニコチン酸アミド 30mg、無水カフェイン 50mg  
(アルコール 0.2mL以下) 添加物：果糖、クエン酸、  
没食子酸プロピル、アルコール、安息香酸Na、pH  
調整剤、バニリン、トウモロコシデンプン、香料  
(1)生薬成分を含むため、沈殿を生じることがあ  
るので、よく振ってから服用して下さい。  
(2)本剤に配合されているビタミンB<sub>2</sub>により、尿が  
黄色になることがありますが、心配ありません。

**保管及び取扱い上の注意**

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。  
(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)開栓  
後の保存及び他の容器への入れ替えをしないで下さい  
(誤用の原因になったり品質が変わります)。(4)使用  
期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

副作用救済制度  
TEL 0120-149-931

®：登録商標

L1905