

服用前にこの説明文書を必ず読むこと。
また、必要なときに読めるよう大切に保管すること。

ビタミン含有保健薬

第3類医薬品

タフボンSII

近年、我々の生活をとりまく環境の変化がはやくなり、肉体的、精神的な疲労を訴える人が多くなってきました。これら心身の疲労は蓄積するとストレスとなり、種々の現代病へと発展します。

健康な日々を送りたいーとは古来人間の願望であります、そのためにも普段から体力をつけ、疲労はその日のうちに取り除くことが大切です。

タフボンS IIは、動物生薬である牛黃、ニンニクの有効成分であるオキソアミヂンを主成分とし、これに健康維持に必要な数種のビタミンを配合した滋養強壮剤です。日々きびしい環境下で作業される方、スポーツマン、虚弱体质、病中病後の方などの体力増強が必要とされる方におすすめします。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤
消化器	恶心・嘔吐、胃部不快感
- しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
軟便、下痢、便秘

効能・効果

滋養強壮、虚弱体质、肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

用法・用量

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2カプセル	2回
15歳未満	服用しないこと	

- 用法・用量を厳守すること。

(裏面に続きます)

成分・分量、作用 1日量 4 カプセル (1,380mg) 中に次の成分を含む。

成 分	4カプセル中	主な作用
酢酸d-α-トコフェロール (ビタミンE)	10mg	体に欠かせないビタミン類で、タンパク質、炭水化物（糖質）、脂質等からエネルギー産生を促し、滋養強壮効果をあらわす。
チアミン硝化物 (ビタミンB1)	20mg	
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB6)	40mg	
リボフラビン (ビタミンB2)	8mg	
ニコチン酸アミド	25mg	
オキソアミヂン末 (加工ダイサン末)	200mg	虚弱体質や肉体疲労時などにすぐれた滋養強壮効果をあらわす。
ゴウ末	3mg	牛の胆のう中に生じた結石で、すぐれた滋養強壮効果をあらわす。

添加物：中鎖脂肪酸トリグリセリド、コハク化ゼラチン、グリセリン、D-ソルビトール、

サラシミツロウ、酸化チタン、パラベン、黄色5号、赤色102号、青色1号

〈成分に関する注意〉

本剤に配合されているリボフラビンにより、尿が黄色になることがある。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

お問い合わせ先

田村薬品工業株式会社 お客様相談室

06-6203-5151

受付時間10:00～17:00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

製造販売元

田村薬品工業株式会社
奈良県御所市西寺田50