


【効能・効果】●滋養強壮●虚弱体質●肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

【用法・用量】成人(15歳以上)1日1回1本(100mL)を服用してください。

【成分・分量】1日量(100mL)中  
リボフラビン(ビタミンB<sub>2</sub>)2mg・ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB<sub>6</sub>)5mg・ニコチン酸アミド40mg・無水カフェイン50mg・タウリン3000mg・L-アルギニン塩酸塩300mg・L-バリン50mg・L-ロイシン100mg・L-イソロイシン50mg・L-アスパラギン酸マグネシウム・カリウム500mg・ローヤルゼリーチンキ50mg(原生薬換算量50mg)・インヨウカクエキス20mg(原生薬換算量110mg)・エゾウコギエキス15mg(原生薬換算量210mg)●添加物として、白糖・クエン酸・安息香酸Na・パラベン・カラメル・香料を含有します。(アルコール0.2mL以下)●本剤の服用により、尿が黄色くなる場合がありますが、これは本剤中のリボフラビンによるもので心配ありません。

副作用被害救済制度  
電話 0120-149-931

 協和薬品工業株式会社  
岐阜県岐阜市野一色二丁目8番6号  
お客様相談室 ☎ 058-246-8771



L-バリン

L-アスパラギン酸  
マグネシウム・カリウム

L-ロイシン

L-イソロイシン

アミノ酸成分

L-アルギニン  
塩酸塩

4000mg

滋養強壮、肉体疲労時の栄養補給

生薬  
+  
ビタミン

配合

イカリソウ  
エゾウコギ  
ローヤルゼリー

タフトミンアミノゴールド

第2類医薬品

【販売名】タフトミンアミノゴールド

【使用上の注意】相談すること

(1)服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。●皮膚：発疹/消化器：胃部不快感、下痢(2)次の場合は、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。●しばらく服用しても症状がよくなる場合

【保管及び取り扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。(4)本剤は生薬を配合していますので、まれに沈殿又は浮遊を生じることがありますが、薬効には変わりありませんので、よく振ってから服用してください。