

滋養強壯、肉体疲労時の栄養補給

第2類医薬品

〔使用上の注意〕

【相談すること】

しばらく服用しても症状がよくなり
ない場合は服用を中止し、この製
品を持って医師、薬剤師又は登録
販売者に相談すること

〔効能・効果〕

●滋養強壯●虚弱体質●肉体疲労・
病中病後・食欲不振・栄養障害・発
熱性消耗性疾患・産前産後などの
場合の栄養補給

〔用法・用量〕

成人(15歳以上)1日1回1本(70mL)
を服用する。
・用法及び用量を厳守すること。

製造販売元

Ringo 金陽製薬株式会社

奈良県五條市住川町1420番地
TEL 0747-22-3451

¥350+税

トツカピン FXII 3000

70mL

販売名：トツカピンFXII

〔成分・分量〕1日量(1本:70mL)中

タウリン3000mg、ニンジンエキス55mg(ニンジン610.5mgに相当)、
イカリソウエキス30mg(イソヨウカク300mgに相当)、ロクジョウチンキ
60 μ L(ロクジョウ18mgに相当)、トチュウ抽出液200 μ L(トチュウ
200mgに相当)、シベットチンキ30 μ L(シベット3mgに相当)、ジョテイ
シエキス50mg(ジョテイシ200mgに相当)、コンドロイチン硫酸エステル
ナトリウム120mg、チアミン塩化物塩酸塩(ビタミンB1)10mg、リボフ
ラビン(ビタミンB2)5mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)8mg、ニコ
チン酸アミド20mg、無水カフェイン50mg、(アルコール含有0.3mL以
下)、添加物として白糖、ブドウ糖果糖液糖、D-ソルビトール、クエン酸、DL-リ
ンゴ酸、L-グルタミン酸Na、DL-アラニン、エドト酸Ca/2Na、リンゴ果汁、
安息香酸Na、パラベン、アルコール、香料、グリセリン、バニリン、エチル
バニリン、安息香酸ベンジルを含有します。・本剤に配合されているリボフ
ラビンにより、尿が黄色になることがあります。・生薬成分を含むため、ま
れに沈澱を生じることがありますが、薬効には支障ありません。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限の過ぎた製品は服用しないこと。
- (5) 凍らせないこと(有効成分が結晶化する場合がある)。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

使用期限

Lot No.

4 987347 203430

ガラス：ピン、金属：キャップ