

販売名 ビルリスルディア

服用に際しては、このラベルをお読みください。

△【使用上の注意】 ▣【相対すること】

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
消化器	吐き気・嘔吐

2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 軟便、下痢 3.1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】●次の諸症状の緩和と神経痛、筋肉痛、関節痛（腰痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、便秘、眼精疲労 ●婦人/ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。●次の場合のビタミンB₁の補給 肉体系疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

【用法・用量】成人（15歳以上）1回1本（50mL）を1日2回服用してください。服用間隔は4時間以上おいてください。

副作用被害救済制度 電話 0120-149-931

製造販売元



中外医薬生産株式会社
三重県伊賀市ゆめが丘7-5-5

お客様相談室：0595-21-3200

受付時間 9:00~17:00（土、日、祝日を除く）

第3類医薬品

眼精疲労・肩こり・腰痛
神経痛・肉体疲労時の
ビタミンB₁補給に

眼 肩 腰

ビルリスルディア

ベンフォチアミン配合 50mL

【成分・分量】1日量
100mL（50mL×2本）中
ベンフォチアミン138mg、
オキソアミチン末（加工大
蒜）200mg、リボフラビン
リン酸エステルナトリウム
15mg、ピロキシン塩酸塩
50mg、ニコチン酸アミド
60mg、アスパラギン酸カ
リウム・マグネシウム400mg
添加物：エトナ酸Ca/Na、
白糖、果糖、D-ソルビトール、
D-マンニトール、クエン酸、dリ
ンゴ酸、パラベン、塩酸、エ
タノール、プロピレングリコール、香料

【保管及び取扱い上の注意】（1）直射日光の当たらぬ涼しい所に保管すること。（2）小児の手の届かない所に保管すること。（3）他の容器に入れ替えないこと（服用の原因になったり品質が変わる。）、（4）使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

本剤は生薬成分を配合していますので、沈澱を生じることがあります。よく振ってから服用してください。

O4RDELCH ガラス：ピン

金 属：キャップ

製造番号

使用期限



4 987307 420983