

■強壯生薬・エキス・ビタミン等33成分をプレミアム配合

滋養強壯剤
春源精® ゴールド

春源精(しゅんげんせい)は強壯はもとより、疲れた時の栄養補給、スタミナ増強、老化にまつわる健康増進などにすぐれた効きめを発揮する医薬品です。

薬王製薬の長年にわたる研究により、生薬やビタミン等を配合した滋養強壯剤を開発しました。

中国古来から大切な薬とされてきた「ゴオウ」をはじめとする動物性生薬と「地黄」にはじまる20種類の植物性生薬、エキス、さらにタウリン、オロチン酸とビタミン類等あわせて33種類の有効成分を配合しました。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
(1)医師の治療を受けている人。(2)薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
- しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

成分及び分量 1日量(9カプセル)中

成分	分量	内 訳	成分	分量	内 訳
ゴオウ	3mg		ゴミシ乾燥エキス	41.7mg	(五味子150mg)
ロクジョウ末	30mg		ジオウ乾燥エキス	20mg	(地黄100mg)
ハンピ末	100mg		ショウキョウ末	100mg	
ローヤルゼリー	100mg	(乾燥物)	トシシ乾燥エキス	13mg	(菟絲子143mg)
サンヤク末	150mg		ニンジン末	300mg	
トウキ末	100mg		バクモンドウ乾燥エキス	50mg	(麦門冬250mg)
イカリソウ乾燥エキス	30mg	(淫羊藿300mg)	加工ダイサン	80mg	(ニンニク8g)
オウセイ末	200mg		チアミン硝化物	15mg	
カシウ乾燥エキス	20mg	(何首烏200mg)	リポフラビン	6mg	
トチュウ末	210mg		ピリドキシン塩酸塩	15mg	
ビャクジュツ末	100mg		トコフェロール酢酸エステル	10mg	
ジャシヨウシ乾燥エキス	25mg	(蛇床子125mg)	ニコチン酸アミド	30mg	
ジョテイシエキス	37.5mg	(女貞子150mg)	パントテン酸カルシウム	15mg	
エソウコギ乾燥エキス	6mg	(刺五加150mg)	オロチン酸	60mg	
オウギ乾燥エキス	15mg	(黄耆120mg)	タウリン	50mg	
カンゾウ乾燥エキス	30mg	(甘草150mg)	無水カフェイン	50mg	
ケイヒ末	100mg				

添加物:メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、デヒドロ酢酸ナトリウム、カルメロースカルシウム、ヒドロキシプロピルセルロース、結晶セルロース、パレシヨテンブ、ステアリン酸マグネシウム、ゼラチン、酸化チタン、青色1号、赤色3号、黄色5号、マクロゴール、ラウリル硫酸ナトリウム

効能又は効果


○滋養強壯 ○肉体疲労・病後の体力低下・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給 ○虚弱体質

用法及び用量

以下の量を、食後に服用してください。

＜用法及び用量に関連する注意＞

(1)定められた用法及び用量を守ってください。(2)カプセルの取り出し方(PTPシートの場合)右図のようにカプセル剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用すること。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながる。)



保管及び取扱い上の注意

- 服用に際しては、説明文書をよく読むこと。
- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。



お問い合わせ先

お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。
薬王製薬株式会社「お客様相談室」電話0744-33-8855
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

春源精ゴールドに使用している動植物生薬の話題

動物性生薬

〔牛黄〕 ゴウオウ		牛の胆嚢又は胆管中に稀に発見される小球塊を乾燥したものでビリルビン系色素、コール酸類の他ペプチド様物質などが含まれています。疲労回復に強い効果をあらわす薬です。
〔鹿茸〕 ロウジヨウ		マンシュウアカジカ、シベリアジカの雄の新生する角化していない幼角を採り乾燥したもので、複合脂質(コリン様作用物質)、コラーゲンなどが含まれています。強壮薬としてすぐれた薬です。

〔反鼻〕 ヒビ		マムシ又はその他同属動物の皮および内臓を除いて乾燥したもので、多くの種類(約20種)のアミノ酸を含有し、栄養価の高い、過労時に用いる強壮薬です。
〔ローゼリル〕 ゼリル		ミツバチの頭部にある分泌腺から分泌される乳白色の女王蜂の育つ餌で王乳と呼ばれます。10-ヒドロキシデセン酸、必須アミノ酸等を含み疲労回復作用があります。

植物性生薬

〔山薬〕 サンヤク		ヤマイモ又はナガイモの根茎で糖タンパク質、アミノ酸、ステロールを含み滋養強壮薬として用いられます。
〔当归〕 トウキ		セリ科の多年草で精油、リグスチリド、プチリデン、フタリド、サクロール、クマリン誘導体を含み、強壮、補血作用があり、血液の循環を高める作用があります。
〔イカリ草〕 イカリクサ		ホサギノイカリ草又は同属植物の葉及び地上部を乾燥したもので、イカリニンというフラボノイド配糖体やアルカロイド等を含み、強壮剤としてよく知られる薬です。
〔黄精〕 オウセイ		カギクマナルコリノ肉質肥大した根茎で粘液質のファルカタン類、ポリゴナキノン、多種のアミノ酸を含み滋養強壮、虚弱症に大変効果があります。
〔何首烏〕 カシウ		ツルドクダミの塊根を乾燥したもので、アントラキノン類のクリソファンール、エモジン等を含み強壮補血薬として使用されているものです。
〔杜仲〕 トチュウ		トチュウの樹皮でグッタペルカ、オークピン、樹脂、精油を含む強壮薬で、肉體疲労時の栄養補給に効果があります。
〔白朮〕 ヒヤクジュツ		オケラの根茎でアトラクチロン、アトラクチノリドを含み、健胃、整腸、滋養強壮作用があります。主に、水分の偏在、代謝異常を治します。
〔蛇床子〕 ジャンヨウシ		セリ科のオカゼリの成熟果実を乾燥したもので、ピネン、カンフェン等の精油やクマリンを含み、滋養強壮作用があります。
〔女貞子〕 ジョテイシ		トウネズミモチの成熟果実を乾燥したものでマンニット、ウルソール酸、ルペオールを含み滋養強壮薬として用いられます。
〔エゾウコギ〕 エゾウコギ		エゾウコギの根皮を乾燥したもので成分にタンニン、ビタミンA、B、配糖体のセサミン、バルミチン酸、リノール酸等を含み、滋養強壮、疲労回復薬です。

〔黄耆〕 オウギ		キバナオウギの根を乾燥したものでグルクロン酸、フェノール配糖体、イソフラボン、サボニン等を含み、強壮薬として又漢方の要薬としても広く用いられます。
〔甘草〕 カンゾウ		マメ科の多年草で主成分はトリテルペノイド系サボニンのグリチルリチン。緊張を和らげる作用をもちます。諸々の急迫症状を緩和し、生薬の作用を調和させます。
〔桂皮〕 ケイヒ		クスノキ科の多年草でケイヒアルデヒド、ケイヒ酸を含み、末梢血管拡張作用があり保健強壮薬として使用されます。
〔五味子〕 ゴミシ		マツブサ科のチョウセンゴミシの成熟果実を乾燥したもので、精油や有機酸(クエン酸、リンゴ酸)を含み、滋養強壮薬として使用します。
〔地黄〕 ジヨウ		アカヤジオウの根でイリドイド化合物のカタルポール、レオヌライド、アミノ酸等を含み、補血強壮薬として効果があります。
〔生姜〕 ショウキョウ		ショウガ科の多年草でその香りの成分はジンギペレン、独特の辛味はジンゲロンとショウガオールという成分です。体を温めて発汗させる作用を持ち、新陳代謝機能を高めて、血管拡張、増強に働きます。
〔菟絲子〕 トシシ		マメダオシの成熟種子を乾燥したものでα-β-γカロチン、タラキサチン、ルテインなどを含み、強壮薬として広く用いられている生薬です。
〔人參〕 ジンセン		朝鮮人參(オタネニンジン)の根を乾燥したもので、人參サポニン(ジンセンノサイド)、精油などが含まれています。滋養強壮、疲労回復の薬として広く使用されています。
〔麦門冬〕 バクモントウ		ユリ科のジャンヒゲの根の肥大部を乾燥したものでステロイドサポニン、フラボノイド、ステロール等を含み、滋養強壮薬です。
〔加工大蒜〕 カコウサイラン		無臭大蒜有効成分で、大蒜(ニンニク)の鱗茎を乾燥し、有効成分 scordinin、alliinのみを抽出した薬で、体力増強作用、ビタミンの体内留保を高める作用があります。