


[成分・分量]
1びん(30mL) 中
カンゾウエキス…500mg
(原生薬換算量 2,500mg)
コウジン乾燥エキス…30mg
(原生薬換算量 300mg)
タウリン…1,000mg
リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2)
…5mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)
…25mg
ニコチン酸アミド…15mg
カルニチン塩化物…50mg
添加物: クエン酸水和物、炭酸水素Na、エタノール、安息香酸Na、パラベン、香料、白糖、黒砂糖、デキストリン
<成分・分量に関する注意>
生薬成分を配合しているため、まれに沈殿を生じることがあります。薬効には影響ありませんので、よく振ってから服用してください。

[効能・効果]

- 肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給
- 虚弱体質
- 滋養強壮



かぜなどで熱が出て
体がだるい
食欲がない
こんな時の栄養補給に!

甘草エキス/紅参エキス/タウリン
ビタミンB2・B6/ニコチン酸アミド/カルニチン塩化物

第2類医薬品 ノンカフェイン
新ヘルビタGR内服液 30mL×3本

[用法・用量]
次の1回量を服用してください。

| 年齢 | 1回量 | 服用回数 |
|---------------|---------------|------|
| 成人 (15歳以上) | 1びん (30mL) | 1日2回 |
| 15歳未満 | 服用しないでください | |

<用法・用量に関する注意>
定められた用法・用量を厳守してください。

[保管及び取扱い上の注意]
(1) 直射日光の当たらぬ涼しい所に保管してください。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
(4) 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

副作用被害救済制度
(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/>
電話: 0120-149-931

▲ 押して開けてください

第2類医薬品

販売名: 新ヘルビタGR内服液

服用に際して、この説明文をお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
長期連用しないでください。

🔴 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 高齢者。

(3) 次の症状のある人。むくみ
(4) 次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、腎臓病

2. 服用後、まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師の診療を受けてください

偽アルドステロン症、
ミオパチー

手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 5~6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

米田薬品株式会社 大阪市浪速区塩草3丁目2-2
お客様相談窓口 電話 06-6562-7411
受付時間 10:00~17:00(土、日、祝日を除く)