

効能又は効果

○滋養強壮 ○虚弱体質 ○肉体疲労・病中
病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性
疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

成分及び分量 (30mL中)

ニンジン・枸杞子・地骨皮・木天蓼・タイソウ浸出液
3mL、淫羊藿浸出液 1mL、チクセツニンジン浸出
液 1mL、L-リジン塩酸塩 300mg、L-トレオニン
15mg、グルクロノラクトン 100mg、コンドロイチ
ン硫酸エステルナトリウム 50mg、グルコン酸カル
シウム水和物 50mg、チアミン塩化物塩酸塩
(V.B1) 10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリ
ウム (V.B2) 3.2mg、ピリドキシン塩酸塩 (V.B6)
5mg、ニコチン酸アミド(ナイアシン) 20mg、オロ
チン酸 60mg、パントテン酸ナトリウム 30mg、イ
ソトール 60mg(アルコール 0.9mL以下)
添加物として、白糖、D-ソルビトール、クエン酸、クエン
酸Na、安息香酸Na、パラベン、香料、エチルパニリン、
パニリン、プロピレングリコール、黄色5号、赤色106号
を含有します


用法及び用量

成人(15才以上)は1日1回、1回30mLを服
用して下さい

お問い合わせ先

発売元 ゼネル薬品工業株式会社
電話番号 06-6352-2381
受付時間 9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元

 **ゼネル** 薬工伊都株式会社
和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東153-1

ZENEL

ノンカフェイン製剤

ビタミン含有保健薬

ネオ**ゼネル**®液-B

生薬7種・アミノ酸・ビタミン・
コンドロイチン・カルシウム配合

第2類医薬品

発売元

ゼネル 薬品工業株式会社
大阪市北区天満3丁目6番1号

使用上の注意

相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた
場合は副作用の可能性がある
ので、直ちに服用を中止し、この
製品を持って医師、薬剤師又は
登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

2.しばらく服用しても症状が
よくなる場合は服用を
中止し、この製品を持って
医師、薬剤師又は登録販売
者に相談して下さい。

保管及び取り扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所
に密栓して保管して下さい
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい
(誤用の原因になったり、品質が変わります)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい
- (5)服用期間中瓶の中の液をよごさないよう(飲み
かけのものを瓶にもどす等)注意して下さい
- (6)本剤は生薬エキスを配合していますので、まれ
に沈澱を生じることがありますが、薬効には変
わりありません

ZENEL

ノンカフェイン製剤
ビタミン含有保健薬

ネオゼネル[®]液-B

生薬7種・アミノ酸・ビタミン・
コンドロイチン・カルシウム配合

第2類医薬品

30mL×10

**ノンカフェイン製剤
ビタミン含有保健薬**

ネオゼネル[®]液-B

第2類医薬品

効能又は効果

- 滋養強壮 ○虚弱体質
- 肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

用法及び用量

成人(15才以上)は1日1回、1回30mLを服用して下さい

成分及び分量(30mL中)

- ニンジン・枸杞子・地骨皮・木天蓼・タイソウ } 浸出液……………3mL
- 淫羊藿浸出液……………1mL
- チクセツニンジン浸出液……………1mL
- L-リシン塩酸塩……………300mg
- L-トレオニン……………15mg
- グルクロノラクトン……………100mg
- コンドロイチン硫酸エステルナトリウム……………50mg
- グルコン酸カルシウム水和物……………50mg
- チアミン塩化物塩酸塩(V.B1)……………10mg
- リポフラビンリン酸エステルナトリウム(V.B2)……………3.2mg
- ピリドキシン塩酸塩(V.B6)……………5mg
- ニコチン酸アミド(ナイアシン)……………20mg
- オロチン酸……………60mg
- パントテン酸ナトリウム……………30mg

- イノシトール……………60mg
 - アルコール……………0.9mL以下
- 添加物として、白糖、D-ソルビトール、クエン酸水和物、クエン酸Na水和物、安息香酸Na、パラベン、香料、エチルパニリン、パニリン、プロピレングリコール、黄色5号、赤色106号を含有します

服用に際して、この説明文を必ずお読み下さい。
また必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

使用上の注意



相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

2.しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

保管及び取り扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい

- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい
(誤用の原因になったり、品質が変わります)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい
- (5)服用期間中瓶の中の液をよごさないよう(飲みかけのものを瓶にもどす等)注意して下さい
- (6)本剤は生薬エキスを配合していますので、まれに沈澱を生じることがありますが、薬効には変わりありません

お問い合わせ先

発売元 ゼネル薬品工業株式会社
電話番号 06-6352-2381
受付時間 9時から17時まで(土、日、祝日を除く)



発売元
ゼネル薬品工業株式会社
大阪市北区天満3丁目6番1号

製造販売元
ゼネル薬工伊都株式会社
和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東153-1



箱
中仕切り

副作用救済制度 ☎0120-149-931

効能又は効果

○滋養強壯 ○虚弱体質 ○肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

成分及び分量 1日量(30mL中)

ニンジン・枸杞子・地骨皮・木天蓼・タイソウ浸出液3mL、淫羊藿浸出液1mL、チクセツニンジン浸出液1mL、L-リジン塩酸塩300mg、L-トレオニン15mg、グルクロノラクトン100mg、コンドロイチン硫酸エステルナトリウム50mg、グルコン酸カルシウム水和物50mg、チアミン塩化物塩酸塩(V.B₁)10mg、リボフラビリン酸エステルナトリウム(V.B₂)3.2mg、ピリドキシン塩酸塩(V.B₆)5mg、ニコチン酸アミド(ナイアシン)20mg、オロチン酸60mg、パントテン酸ナトリウム30mg、イノシトール60mg(アルコール0.9mL以下)

添加物として、白糖、D-ソルビトール、クエン酸水和物、クエン酸ナトリウム水和物、安息香酸Na、パラベン、香料、プロピレングリコール、黄色5号、赤色106号を含有します

用法及び用量

成人(15才以上)は1日1回、1回30mLを服用して下さい

お問い合わせ先

発売元 ゼネル薬品工業株式会社
電話番号 06-6352-2381
受付時間 9時から17時まで(土、日、祝日を除く)



製造販売元
ゼネル薬工伊都株式会社
和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東153-1

第2類医薬品

ZENEL

ネオゼネル[®]液-B

人 参 大 棗
枸 杞 子 淫 羊 藿
地 骨 皮 竹 節 人 参
木 天 蓼 ア ミ ノ 酸

発売元
ゼネル薬品工業株式会社
大阪市北区天満3丁目6番1号

使用上の注意



相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

2.しばらく服用しても症状がよくなる場合、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい(誤用の原因になったり、品質が変わります)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい
- (5) 服用期間中瓶の中の液をよごさないよう(飲みかけのものを瓶にもどす等)注意して下さい
- (6) 本剤は生薬エキスを配合していますので、まれに沈澱を生じることがありますが、薬効には変わりありません

ZENEL



ビタミン含有保健薬

ネオゼネル[®]液-B

第2類医薬品

人 参
枸 杞 子
地 骨 皮
木 天 蓼
大 棗
淫 羊 藿
竹 節 人 参
配合



発売元

ゼネル薬品工業株式会社
大阪市北区天満3丁目6番1号

ビタミン含有保健薬

第2類医薬品

ネオゼネル[®]液-B

効能又は効果

- 滋養強壮 ○虚弱体質
- 肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

用法及び用量

成人(15才以上)は1日1回、1回30mLを服用して下さい
*計量容器を添付します

成分及び分量 (30mL中)

ニンジン・枸杞子・地骨皮 } 浸出液……………3mL
木天蓼・タイソウ }
淫羊藿浸出液……………1mL
チクセソニン浸出液……………1mL
L-リジン塩酸塩……………300mg
L-トレオニン……………15mg
グルクロノラクトン……………100mg
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム……………50mg
グルコン酸カルシウム水和物……………50mg
チアミン塩化物塩酸塩(V.B1)……………10mg
リボフラビンリン酸エステルナトリウム(V.B2)……………32mg
ピリドキシン塩酸塩(V.B6)……………5mg
ニコチン酸アミド(ナイアシン)……………20mg
オロチン酸……………60mg
パントテン酸ナトリウム……………30mg
イノシトール……………60mg
アルコール……………0.9mL以下
添加物として、白糖、D-ソルビトール、クエン酸、クエン酸Na、安息香酸Na、パラベン、香料、エチルパラニリン、バニリン、プロピレングリコール、黄色5号、赤色106号を含有します

服用に際して、この説明文を必ずお読み下さい。
また必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

2. しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい
(誤用の原因になったり、品質が変わります)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい
- (5) 服用期間中瓶の中の液をよごさないよう(飲みかけのものを瓶にもどす等)注意して下さい
- (6) 本剤は生薬エキスを配合していますので、まれに沈澱を生じることがありますが、薬効には変わりありません

お問い合わせ先

発 売 元 ゼネル薬品工業株式会社
電話番号 06-6352-2381
受付時間 9時から17時まで(土、日、祝日を除く)



ZENEL



ビタミン含有保健薬

ネオ**ゼネル**®液-B

第2類医薬品

生薬7種

アミノ酸

ビタミン

コンドロイチン

カルシウム

配合

ZENEL



第2類医薬品

ビタミン含有保健薬

ネオ**ゼネル**®液-B

人参・枸杞子・地骨皮・木天蓼
大棗・淫羊藿・竹節人参 配合



販売元・お問い合わせ先 製造販売元
ゼネル薬品工業株式会社 和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東153-1
大阪市北区天満3丁目6番1号 和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東153-1
☎06-6352-2381
(9時~17時まで、土、日、祝日を除く)



ZENEL

製造販売元

ゼネル 薬工伊都株式会社

和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東153-1