

用法・用量

成人(15才以上)1回1本(30mL)
1日2回服用してください。服用間
隔は4時間以上おいてください。

効能・効果

滋養強壯、虚弱体質、
肉体疲労・病中病後・
食欲不振・栄養障害・
発熱性消耗性疾患・産
前産後などの場合の栄
養補給

使用上の注意

相談すること 1.服用後、
次の症状があらわれた
場合は副作用の可能性
があるので、直ちに服
用を中止し、この文書
を持って医師、薬剤師
又は登録販売者に相談
してください。

皮膚：発疹／消化器：
胃部不快感、下痢

2.しばらく服用して
も症状がよくなりな
い場合は服用を中止
し、この文書を持っ
て医師、薬剤師又は
登録販売者に相談し
てください。

取扱い上の注意

- 1.服用に際しては、記
載事項をよく読んで
ください。
- 2.小児の手のとどかな
い所に保管してくだ
さい。
- 3.直射日光の当たらな
い涼しい所に保管し
てください。
- 4.使用期限のすぎた製
品は服用しないでく
ださい。

製造番号：

使用期限：



滋養強壯剤

ゼットアップ



Z・UP

ゴオウ浸出液

ロクジョウチンキ

ニクジュヨウ流エキス

ローヤルゼリー

第3類医薬品

成分・分量 1本(30mL)中
ゴオウ浸出液……………2,000mg
(原生薬換算……………2mg)
ロクジョウチンキ……………100mg
(原生薬換算……………30mg)
ニクジュヨウ流エキス……0.1mL
(原生薬換算………100mg)
ローヤルゼリー……………25mg
タウリン……………1,000mg
グルクロノラクトン……………100mg
コンドロイチン
硫酸ナトリウム……………100mg
イノシトール……………100mg
チアミン塩化物塩酸塩(V.B1)
……………10mg
リボフラビンリン酸エステル
ナトリウム(V.B2)……………5mg
ピリドキシン塩酸塩(V.B6)……5mg
シアノコバラミン(V.B12)…5μg
ニコチン酸アミド……………20mg
パンテノール……………20mg
カフェイン水和物……………25mg

添加物：ブドウ酒、白糖、D-ソルビ
トール液、クエン酸、コハク酸2Na、
DL-リンゴ酸、パラベン、安息香酸、
安息香酸Na、カラメル、香料、エタ
ノール

(アルコール0.5mL以下)

※まれに沈殿(生薬による)を生じ
ることがありますが、薬効には
変わりありません。

※ビタミンB2が配合されていま
すので、尿が黄色くなることが
あります。

副作用被害救済制度の問合せ先
電話:0120-149-931(フリーダイヤル)

発売元

日邦薬品工業株式会社
東京都渋谷区代々木3-46-16
<http://www.nippo-yakuhin.jp/>
お客様相談室 03-3370-7174(代表)

製造販売元

福井製薬株式会社
大阪市城東区今福東3丁目1番26号