

服用に際し、表示事項を必ず読むこと。



使用上の注意

相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は、副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品をもって医師、薬剤師または登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

2. しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品をもって医師、薬剤師または登録販売者に相談すること。

成分分量

30mL中

成分	分量
肝臓加水分解物	600mg
心臓エキス	300mg
チアミンシスルフィド(ビタミンB ₁)	13.5mg
リボフラビン(ビタミンB ₂)	3mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	3mg
シアノコバラミン(ビタミンB ₁₂)	30μg

添加物:クエン酸水和物、パラベン、プロピレングリコール、pH調節剤、香料、ハチミツ、白糖、ブドウ糖、カラメル

〈成分分量に関する注意〉
尿を黄変させることがある。

製造販売元

健創製薬株式会社

東京都中央区日本橋小舟町9-17

お客様相談窓口 TEL 03-3527-3690

受付時間:午前10時~12時、午後1時~5時

(土・日・祝日を除く)

500mL

第3類医薬品

滋養強壯

エンクレパン®

肝臓加水分解物 ビタミンB₁・2・6・12 心臓エキス配合

効能効果

- 滋養強壯。
- 虚弱体質。
- 肉体疲労・病後の体力低下・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給。

用法用量

通常1日量30mLを2~3回に分けて随時服用する。
(計量には添付の目盛り付きコップを使用ください。
数字の単位はmLです。)

開栓時に記入してください。

開栓年月日

品質保持の点から、開栓後3週間以内に服用すること。

開栓後要冷蔵

保管および取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
2. 小児の手のとどかない所に保管すること。
3. 他の容器に入れかえないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
4. 開栓後はフタをしっかりしめ、冷蔵庫に立てて保管すること。
5. 雑菌などの汚染の恐れがあるので、ビンの方に直接口をつけて服用したり、目盛り付きコップに入れたものをビンに戻さないこと。
6. 服用途中、味・においなどに変化があり異常を感じた場合には、直ちに服用を中止すること。
7. ビンの口、目盛り付きコップは清潔に保つこと。
8. 表示の使用期限を過ぎたものは服用しないこと。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

製造番号◆使用期限(年.月)



キャップ:PP・中栓:PP

フィルム:PET・目盛り付きコップ:PS

ガラス:ビン

AS2209