

2010年4月改定

第3類医薬品

この説明書は本剤とともに保管し、
服用に際しては必ずお読みください

薬用ニンジン流エキス剤 滋養強壯剤

フロー パナックス

Furo Panax

【特 徴】

薬用ニンジン^{ごうらい}は、日本では奈良時代の頃より使われ、胃腸の働きを整えることで、冷え症・虚弱体質・肉体疲労などの改善が期待される事から、保健強壯薬・健胃薬として漢方処方に配合されてまいりました。

しかし日本には自生しておらず全てが輸入品であったため、産地名から“高麗ニンジン・朝鮮ニンジン”などの呼び名が付きましました。また、江戸時代8代将軍吉宗の命により、江戸幕府が世界に先駆け現在の日光で栽培方法を確立し、この栽培方法・種を^{おかみ}広めた事から、御上から頂いた意味を込め“御種^{おたね}ニンジン”とも呼びます。また今なお、弊社/信州上田丸子地域は、薬用人参の主要生産地として知られております。

弊社フローパナックスは、この薬用ニンジン^{ごうらい}を水・エタノール（約40%）を用い、日本薬局方流エキス剤の製法で抽出した液体の医薬品です。液剤のため、飲み易く、煎じる手間・加減などの必要もなく簡単に服用出来ます。



【使用上の注意】



してはいけない事 (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

- 次の人は服用しないでください。
 - 手術や出産直後等で出血中の人。(血行を促進するため)
 - 7歳以下の小児。
- 乗物又は機械類の運転操作を行う場合は服用しないでください。(アルコールを含有するため)



相談する事

- 次の人は服用前に、医師または薬剤師にご相談ください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 授乳中の人。
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - アルコールに過敏な人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師にご相談ください。
 - 服用後、次の症状があらわれた場合。

| 関係部位 | 皮 膚 | 消化器 |
|------|-----------|-------|
| 症状 | 発疹・発赤、かゆみ | 胃部不快感 |

- しばらく服用しても症状がよくなる場合。

【効能・効果】

次の場合の滋養強壮：

虚弱体質、肉体疲労、病中病後、胃腸虚弱、食欲不振、血色不良、冷え症、発育期

【用法・用量】

- ・成人は、1日1回3～5mL（添付のカップにて計量下さい）を、水あるいはアルコール性飲料に溶かして、空腹時に服用します。
- ・小児（8～14歳）は1日1回1.5～2.5mLを水に溶かして、空腹時に服用します。

《用法用量に関連する注意》

- ・用法及び、用量を厳守してください。
- ・計量容器はご使用のつど、水洗いなどして常に清潔に保管してください。

【成分・分量】

フローパナックスは、本品1mL中にニンジン1gの可溶性成分を含みます。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 本剤は、高濃度のアルコール製剤です。
 - ・蒸発を防ぐ為、ご使用後はなるべく早くキャップをしてください。
 - ・直射日光の当たらない涼しい場所に、密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない場所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因・また品質に変化を及ぼす場合があります）
- (4) 品質保持の点から、開封した後は3ヵ月以内に服用してください。
- (5) びんの口やキャップに成分が乾燥固着することがあります。その場合には清潔なガーゼ等で、軽くふきとってご使用ください。
- (6) 服用時の気温や液温などにより、多少香味が違うように感じられることがありますが、品質・効果に変わりはありません。
- (7) 生薬成分が沈殿する場合があります。よく振ってからご使用ください。

【消費者相談窓口】

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店又は下記までご連絡ください。

信州製薬 株式会社 くすり相談室

電話：0120-961-055

受付時間 9:00～17:00（土日祝日等除く）

製造販売元 **信州製薬株式会社**

本社 〒386-1212 長野県上田市富士山2416-34