

【使用上の注意】

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起りやすくなります)

生後3ヶ月未満の乳児は服用しないでください

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚(ひふ)	発疹・発赤、かゆみ

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 軟便、下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

第3類医薬品

《日本薬局方ニンジン末》

トチモトの

ニンジン末

内容量 500g

【成分・分量】 本品1日量(3.0g)中 日本薬局方ニンジン末3.0g

【効能・効果】

次の場合の滋養強壮：虚弱体質、肉体疲労、病中病後、胃腸虚弱、食欲不振、血色不良、冷え症

【用法・用量】

大人(15歳以上)は1回1g、1日3回、食前又は食間に服用する。

15歳未満 7歳以上 大人の2/3 (0.6g)

7歳未満 4歳以上 大人の1/2 (0.5g)

4歳未満 2歳以上 大人の1/3 (0.3g)

2歳未満 大人の1/4 (0.2g)以下を服用する。

(添付のさじ1杯約1g)

【用法・用量に関する注意】

- 定められた用法・用量を守り、正しくお使いください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 1歳未満の乳児には、止むを得ない場合の他は、服用させないでください。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に封をして保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)

[脱酸素剤入]

製造番号

使用期限

副作用被害救済制度

☎0120-149-931



株式会社 橋本天彦堂

大阪市北区末広町3番21号
TEL 06(7711)0730