

**2017年12月改訂 (第6版)

*2012年6月改訂 (第5版)

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保存してください。

第3類医薬品 日本薬局方 ブドウ酒

【特徴】

(1)本剤はブドウの果実を発酵して得た赤ブドウ酒です。(2)本剤は合成甘味料および合成着色料を含みません。(3)本剤は赤紫色の液で、特異な芳香があり、味はわずかに渋く、やや刺激性があります。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください。

(1)手術や出産直後の人。(血行を促進するため)

* (2)乗り物又は機械類の運転作業や危険な作業を行う人。(アルコールを含有するため)

■ 相談すること

*1. 次の人は使用前に、医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3)授乳中の人。
- (4)アルコールに過敏な人。
- (5)本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (6)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

*2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

*3. 5～6日間服用しても症状の改善がみられない場合は、使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能又は効果】食欲増進、強壮、興奮下痢、不眠症、無塩食事療法

【用法及び用量】通常、成人1回1食匙(15mL)又は1酒杯(60mL)を服用する。

<用法・用量に関する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)ビンから直接服用しないでください。

【成分及び分量】本剤1mL中に日本薬局方ブドウ酒1mLを含む。*本剤はエタノール11.0～14.0vol%及び酒石酸0.10～0.40w/v%を含む。酸化防止剤としてピロ亜硫酸カリウムを含む。

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)誤用を避け、品質を保持するために、他の容器に入れかえないでください。* (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く服用してください。(5)使用の都度ビンのキャップをしっかり締めてください。

【包装】500mL

【お問い合わせ先】

- * (1)購入した薬局・薬店
- (2)中北薬品株式会社 製薬工場事業部
電話 0567-32-1431
受付時間:9時から17時まで
(土、日、祝日及び弊社指定休日を除く)

製造番号:



詰替日:

使用期限: 詰替日より3年

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

未成年者の飲酒は、
法律で禁止されています



製造販売元  中北薬品株式会社

愛知県津島市白浜町字番場52-1

(詰替場所: 輪厚工場 北海道北広島市輪厚工業団地2丁目2-2)

開封口



眠れない
食欲がない」などに
おくすりのブドウ酒。




日本薬局方

ブドウ酒

第3類医薬品

果実酒 500mL
アルコール分
11.0～14.0vol%

 中北薬品株式会社



眠れない
食欲がない」などに
おくすりのブドウ酒。



日本薬局方

ブドウ酒

第3類医薬品

果実酒 500mL
アルコール分
11.0～14.0vol%

 中北薬品株式会社