

この添付文書は服用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保管してください。

和漢薬製剤

第2類医薬品

まわた薬順血五香湯

女性特有の症状には、頭痛・いろいろなどがありますが、特に生理時・産前産後・更年期にはげしく、いくつかの症状が重なってからだ全体に不快感となってあらわれてきます。

また現代は、職場や家庭にも冷房が普及しているため、下半身の冷え・頭痛・夏かぜなどに悩む女性も増えています。

まわた薬順血五香湯は、これらの症状にはたらく和漢薬を配合したもので、緩やかに作用し、女性特有の症状である月経不順・血の道症・頭痛・手足腰冷込などの諸症状に効果をあらわします。

△ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1)医師の治療を受けている人
 - (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振

3. しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

■ 効能・効果

産前産後、血の道、月経不順、頭痛、逆上、眩暈（めまい）、つわり、ヒステリー、妊娠浮腫、手足腰冷込、感冒

■ 用法・用量

1日1貼を、毎食前或は空腹時及び夜就寝前に次の方法で服用してください。

年 齢	服 用	服用方法及び服用量
大人（15歳以上）	1～3回目 (毎食前30分或は空腹時)	そのつど約200mL（約1合）の沸湯を加えて振り出し服用する。
	4回目 (夜就寝前)	水約300mL（約1合5勺）を加え、約200mL（約1合）になるまで煎じ服用する。
15歳未満	服用しないこと	

※定められた用法・用量を厳守してください。

裏面につづく

■成分・分量

1貼(12g)中に次の成分を含有しています。

トウキ	1.0g
センキュウ	1.5g
シャクヤク	1.0g
ボタンピ	0.6g
カンゾウ	0.3g
ケイヒ	1.0g
ブクリョウ	1.0g
コウブシ	1.0g
モッコウ	1.0g
チヨウジ	0.2g
ソウジュツ	1.0g
シュクシャ	0.4g
チンピ	2.0g

■保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)3回の振り出しの後は、そのつど直ちに本剤をラップ等で包み、次回の服用時まで冷蔵庫等直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

■お問い合わせ先

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までお願いします。

日野薬品工業株式会社 お客様相談窓口

電話：0748-52-1232 受付時間：9時～17時（土、日、祝日を除く）

製造販売元

日野薬品工業株式会社

滋賀県蒲生郡日野町上野田119