

使用量  
目安

100

200

300

開封日 年 月 日

とりかえの目安 年 月 日

第3類医薬品

泡の

アルコール手指消毒剤

ウエルパス®  
フォーム



飲みません

洗い流し不要

火気注意

エタノール  
約64vol%含有  
(添加物として)

360mL

製造番号  
使用期限

残量  
目安

200

100

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。

△使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと  
手指の皮膚の治療を受けている人。
2. 次の部位には使用しないこと  
(1) 損傷のある皮膚。  
(2) 目の周囲、粘膜等。(局所刺激作用がある。)

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

●効能・効果 手指の殺菌・消毒

●用法・用量 適量を手指にとり、塗布又は塗擦する。

(用法・用量に関連する注意)

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (4) 血液や汚物が付着している場合には、石けんでよく洗浄し、石けん分を十分洗い落とした後、使用すること。
- (5) 外用にのみ使用し、内服しないこと。
- (6) 手に取った後、塗り広げ、洗い流さないこと。

●成分・分量

本剤100mL中 ベンザルコニウム塩化物0.2g  
及び添加物としてポリオキシエチレン・メチルポリシロキサン共重合体、グリセリン、プロピレングリコール、グリチルリチン酸二カリウム、エデト酸ナトリウム水和物、エタノール 含有

●保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 火気に近づけないこと。
- (5) 本剤はアルコールを含有しているため床にこぼれると変色する場合がありますので注意すること。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
- (7) 使用時は、ストッパーを外すこと。

【お問合せ先】

丸石製薬株式会社 学術情報部  
大阪市鶴見区今津中2-4-2  
TEL.0120-014-561

副作用被害救済制度のお問合せ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
[https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)  
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

販売名:ウエルパスフォーム 第3類医薬品

ポンプ: PP、PE  
ボトル: PE  
ストッパー: PE  
ラベル: PE

この製品は透明フィルムで  
包装しています

火気注意

エタノール  
(約56w/w%)

deb foam technology™

製造販売元

丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

A-2



4