

回数
目安(回)

—ゲル状速乾性すり込み式手指消毒剤—

ピュアラビング®

手指の殺菌・消毒

使用開始

月

日

MICROSHIELD®
Skincare Products

うるおい
成分配合

250 mL

第3類医薬品



schülke -+

MORaine CORP.




残量
目安(mL)

Purerubbing®



適量を手にとり
手指全体に
まんべんなくすり込み
乾燥させてください。

ご使用時はノズルカバーを
取り外さないでください



使用後、空容器を図
のように折り目
に沿って押しつぶし
てください。
(つぶした後は元
に戻りません。)



ボトル: PE
ポンプ: PP
ラベル: PE
外装フィルム: PE

火気厳禁

アルコール類
(エタノール)
危険等級II 水溶性

使用に際しては、下記の説明書きをよく読んでください。

△ 使用上の注意

⊗してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないこと。

(1) 損傷のある皮膚 (2) 目の周囲、粘膜等

☞ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

- (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

【効能又は効果】 手指・皮膚の殺菌・消毒

【用法及び用量】 適量を消毒部位に塗布または塗擦する。

<用法及び用量に関連する注意>

- (1) 用法及び用量を厳守すること。(2) 血液や汚物などが付着している場合には、石鹸でよく洗浄後、使用すること。(3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(4) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。(5) 外用にのみ使用し、服用しないこと。
- 【成分及び分量】 本剤 100mL 中 日局エタノール 83mL

使用期限・製造番号は、容器底面に記載しております。

添加物: イソプロパノール、ミリスチン酸
イソプロピル、グリセリン、2-メタクリロ
イルオキシエチルホスホリルコリン・メタ
クリル酸ブチル共重合体液(リビジュア®)、
ヒドロキシプロピルセルロース、その他
2成分を含む。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管すること。(2) 小児の手の届かないところに保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4) 火気に近づけないこと。(5) 取扱う場合、換気を十分行うこと。(6) 本剤はアルコールを含有しているため床にこぼれると変色する場合がありますので注意すること。(7) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。(8) ノズルに薬液が詰まった場合は取り除くこと。(9) ポンプを強く押さないこと。

販売元・お問い合わせ先: 株式会社 モレーンコーポレーション
〒164-0003 東京都中野区東中野5-1-1
TEL: 03-5338-3911
受付時間: 平日9:00~18:00 (土日祭日除く)

発売元: シュルケ・ジャパン合同会社

製造販売元: 日油株式会社
〒150-6019 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号

「リビジュア」は日油株式会社の登録商標です。
21A ©登録商標



副作用被害救済制度のお問い合わせ先:
(独) 医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

第3類医薬品

MICROSHIELD®
Skincare Products

ーゲル状速乾性すり込み式手指消毒剤ー

ピュアラビング®

手指の殺菌・消毒

使用開始

月

日

うるおい
成分配合



500 mL

ご使用時は ノズルカバーを
取り外さないでください



schülke +

MORAINE CORP. MORaine CORP.

Purerubbing®



適量を手にとり
手指全体に
まんべんなくすり込み
乾燥させてください。

使用に際しては、下記の説明書きをよく読んでください。

▲ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないこと。
- (1) 損傷のある皮膚 (2) 目の周囲、粘膜等

☒ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

【効能又は効果】 手指・皮膚の殺菌・消毒

【用法及び用量】 適量を消毒部位に塗布または塗擦する。

<用法及び用量に関連する注意> (1) 用法及び用量を厳守すること。(2) 血液や汚物などが付着している場合には、石鹸でよく洗浄後、使用する。(3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(4) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。(5) 外用にのみ使用し、服用しないこと。

【成分及び分量】 本剤 100mL 中 日局エタノール 83mL

添加物：イソプロパノール、ミリスチン酸イソプロピル、グリセリン、2-メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン・メタクリル酸ブチル共重合体液(リビジュア®)、ヒドロキシプロピルセルロース、その他2成分を含む。

【保管及び取扱い上の注意】 (1) 直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる) (4) 火気に近づけないこと。(5) 取扱う場合、換気を十分行うこと。(6) 本剤はアルコールを含有しているため床にこぼれると変色する場合がありますので注意すること。(7) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。(8) ノズルに薬液が詰まった場合は取り除くこと。(9) ボンプを強く押さないこと。

使用期限・製造番号は容器底面に記載しております。

販売元：株式会社 モレーンコーポレーション
〒164-0003 東京都中野区東中野5-1-1
TEL:03-5338-3911
受付時間：平日9:00~18:00(土日祭日除く)

発売元：シュルケ・ジャパン合同会社
製造販売元：日油株式会社
〒150-6019 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号
「リビジュア」は日油株式会社の登録商標です。21A ©登録商標

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独) 医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

火気厳禁

アルコール類
危険等級Ⅱ
水溶性



ボトル：PE
ポンプ：PP
外装フィルム：PE



4