



消毒用エタノール

第3類医薬品

100mL



日本薬局方

消毒用エタノール

第3類医薬品

100mL

火気注意

使用に際してこのケースの説明文をよくお読み下さい。
また、必要ときに読めるよう大切に保管して下さい。

【使用上の注意】

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用
が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないこと
粘膜(口唇等)、目の周囲

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録
販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 患部が広範囲の人。
- (4) 深い傷やひどいやけどの人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副
作用の可能性があるので、直ちに使用を
中止し、このケースを持って医師、薬剤師
又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場
合は使用を中止し、このケースを持って医
師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

創傷面の殺菌・消毒

【用法・用量】

本液を脱脂綿、ガーゼ等に浸して患部に軽く
塗る。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 局所刺激作用があるので、軽く塗るだけ
にとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して患部
に貼付しないこと。
- (3) 過度に使用すると、脱脂等による皮膚荒
れを起こすことがある。
- (4) 広範囲又は長時間使用する場合には、蒸
気の吸入に注意すること。
- (5) 小児に使用させる場合には、特に注意し、
保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (6) 目に入らないよう注意すること。万一、目
に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯
で洗うこと。なお、症状が重い場合には、
直ちに眼科医の診療を受けること。
- (7) 外用にのみ使用し、内服しないこと。

【成分・分量】

エタノール 76.9～81.4vol%

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して
保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 使用時は、薬液により変質、変色等をお
こすおそれがあるので液だれ、こぼれには注
意すること。
- (4) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因
になったり品質が変わる。)
- (5) 火気に近づけないこと。

【お問合せ先】

丸石製薬株式会社 学術情報グループ
大阪市鶴見区今津中2-4-2 TEL. 0120-014-561

副作用被害救済制度

☎0120-149-931(フリーダイヤル)

製造番号
使用期限



製造販売元

日興製薬株式会社

岐阜県羽島市江吉良町1593

発売元

丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2