

**2023年7月改訂(第7版)

*2012年7月改訂(第6版)

貯法	気密容器、室温保存、火気を避けて保存 (開封後はなるべく早く使用すること)
使用期限	包装に表示の使用期限内に使用すること

日本商品標準分類番号	872615
承認番号	21100APZ00281000
承認年月	1999年5月17日
販売開始	1999年8月

ご使用に際してこの添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

(外用消毒剤) 70vol%イソプロパノール含浸綿

第3類医薬品

ワンショットプラス[®]

*【特徴】

70vol%イソプロパノール含浸のアルコール綿

【使用上の注意】

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないこと

粘膜、創傷面および目のまわり

* 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- 医師の治療を受けている人
- 本人又は家族がアレルギー体質の人
- 薬や化粧品でアレルギー症状(発疹・発赤・かゆみ等)を起こしたことがある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

その他の注意

- 皮膚に発赤を起こすことがあるので、アレルギーテストの検査に影響を及ぼすことがある。
- 本品はアルコールのみによる殺菌作用を目的としており、すべての細菌やウイルスに効果があるものではない。

【効能・効果】

手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒

【用法・用量】

そのまま塗擦、清浄用として用いる

(用法・用量に関連する注意)

- 外用にのみ使用すること。
- 目に入らないよう注意すること。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けること。
- 過度に使用すると、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがある。
- 広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。

- アルコール分がタンパク質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、医療機器等を清拭する際は血清膿汁等を十分に洗い落としてから使用すること。

**【成分・分量】

溶液…日本薬局方イソプロパノールに、溶剤として日本薬局方精製水
適量を含有する(70vol%イソプロパノール液)。

医療脱脂綿…本品の溶液100mLあたり22.2gである。

【保管及び取り扱い上の注意】

- アルコール又は他の薬剤を注入して使用しないこと。また、脱脂綿を継ぎ足して使用しないこと。
- 乾燥を防ぐため、使用後は上部のチャックを指で押し、しっかり閉めること。
- 直射日光を避け、なるべく涼しい所に保管すること。
- 火気に近づけないこと。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 使用後はトイレに流さないで、衛生的に処理すること。
- 綿の表面あるいは内部に黄色又は黒色の斑点状のものが見られることがあるが、天然の種子の一部であるので使用上の問題はない。
- 誤用や品質の低下を避けるため、再使用や他の容器に移し替えないこと。

【火気厳禁】

【消費者相談窓口】

白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田3-23-12

お客様相談室 TEL 0120-01-8910(フリーダイヤル)

受付時間/9:00~17:00(月~金)※祝日を除く。

休日・夜間 TEL 03-3987-6111

【製造販売業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田3-23-12

** <https://www.hakujii.co.jp/>

副作用被害救済制度の問合せ先 (独)医薬品医療機器総合機構	電話 ☎ [®] 0120-149-931
----------------------------------	-----------------------------------