

皮ふ保湿 抗炎症 血行促進 修復促進

ヒルドベールα

高保湿・油性クリーム

第2類医薬品



第2類医薬品

ヒルドベールα

乾燥肌の治療薬

高保湿・油性クリーム

4つの作用で乾燥肌を改善

皮ふ保湿 抗炎症 血行促進 修復促進



低刺激性 無香料・無着色 100g

外用薬

販売名 第2類医薬品

ヒルドベールα

成分・分量 (100g中)

ヘパリン類似物質……… 0.3g
アラントイン……… 0.2g
トコフェロール酢酸エステル… 0.5g
添加物:グリセリン、流動パラフィン、スクワラン、プロピレングリコール、ワセリン、グリセリン脂肪酸エステル、パラフィン、マイクロクリスタリンワックス、パラベン、エドト酸Na、ヒアルロン酸Na

効能・効果

手指の荒れ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手足のひび・あかぎれ、乾皮症、小児の乾燥性皮膚、しもやけ(ただれを除く)、きず・やけどのあとの皮膚のしこり・つぶり(顔面を除く)、打身・ねんざ後のはれ・筋肉痛・関節痛

製造販売元 万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五桂1169-142

万協製薬株式会社「お客様相談室」
電話 0598-30-5376
受付時間 10:00~17:00
(ただし、土、日、祝日は除きます)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

紙箱 MADE IN JAPAN



4 535653 002850

使用期限
製造番号

用法・用量

1日1~数回、適量を患部にすりこむが、又はガーゼ等にのばして貼ってください。

(用法・用量に関連する注意)

- (1)定められた用法・用量を守ってください。
- (2)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3)外用にのみ使用してください。
※出血のある傷口には使用しないでください。(血が止まりにくくなる可能性があります。)
※顔面にある傷あと、やけどのあとには使用しないでください。
- (4)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

保管及び取扱い上の注意

- (1)本剤のついた手で、目などの粘膜に触れないでください。
- (2)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (3)小児の手の届かない所に保管してください。
- (4)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。

開封口

△ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください。
(1)出血性血液疾患(血友病、血小板減少症、紫斑病など)の人。
(2)わずかな出血でも重大な結果をきたすことが予想される人。(血液凝固抑制作用を有し出血を助長するおそれがあります)
2. 次の部位には使用しないでください。
目、粘膜(口腔、鼻腔、膈など)

🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)医師の治療を受けている人。
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3)湿潤やただれのひどい人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、紫斑

3. 5~6日間使用しても症状がよくなるない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

A2408