



製造番号
使用期限



1

第2類医薬品 20g

OPEN

手指のあれ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手足のひび・あかぎれ、乾皮、しもやけ(ただれを除く)
きず・やけどのあとの皮膚のしこり・つっぱり(顔面を除く)

第2類医薬品

20g

Ⅰパリン類似物質配合 ヒルロイゼクリーム

手指のあれ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手足のひび・あかぎれ、乾皮、小児の乾燥性皮膚、しもやけ(ただれを除く)
きず・やけどのあとの皮膚のしこり・つっぱり(顔面を除く)

A2409

ヒルロイゼクリーム



喜遠妥®ヒルロイゼクリーム
繰り返す乾燥肌に!

省資源化のため箱が添付文書を兼ねています。ご使用に際して、この箱の記載内容を必ず読んでください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

〈外皮用薬〉
販売名 ヒルロイゼクリーム 第2類医薬品

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

- 1. 次の人は使用しないでください。
 - (1) 出血性血液疾患(血友病、血小板減少症、紫斑病など)の人
 - (2) わずかな出血でも重大な結果をきたすことが予想される人(血液凝固抑制作用を有し出血を助長するおそれがあります)
- 2. 次の部位には使用しないでください。
 - 目、粘膜(口腔、鼻腔、膣など)

🗨️ 相談すること

- 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 潤滑やただれのひどい人
- 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、紫斑

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

手指のあれ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手足のひび・あかぎれ、乾皮症、小児の乾燥性皮膚、しもやけ(ただれを除く)、傷・火傷のあとの皮膚のしこり・つっぱり(顔面を除く)、打ち身・捻挫後のはれ・筋肉痛・関節痛

用法・用量

1日1~数回、適量を患部に擦り込むか、またはガーゼ等にのばして貼ってください。

用法・用量に関する注意

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。(2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(3) 外用にのみ使用してください。*出血のある傷口には使用しないでください。(血が止まりにくくなる可能性があります。)*顔面にある傷あと、やけどのあとには使用しないでください。(4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

成分・分量

(100g中) Ⅰパリン類似物質 0.3g 添加物:グリセリン、流動パラフィン、スクワラン、プロピレングリコール、ワセリン、グリセリン脂肪酸エステル、パラフィン、マイクロクリスタリンワックス、パラベン、エドト酸Na、ヒアルロン酸Na

保管及び取扱い上の注意

- (1) 本剤のついた手で、目などの粘膜に触れないでください。(2) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(3) 小児の手の届かない所に保管してください。(4) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。

販売元 三井薬品株式会社
東京都千代田区岩本町2-10-2 神田ワザビル8階
製造販売元 万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五柱1169-142

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931
三井薬品株式会社「お客様相談室」
電話 03-5809-2790
受付時間 10:00~17:00
(ただし、土、日、祝日は除きます。)

MADE IN JAPAN

Ⅰパリン類似物質配合
喜遠妥®ヒルロイゼクリーム

第2類医薬品

Ⅰパリン類似物質配合

喜遠妥®ヒルロイゼクリーム

第2類医薬品

M022



製造番号
使用期限



1

第2類医薬品 30g

OPEN

手指のあれ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化
症、手足のひび・あかぎれ、乾皮症、しもやけ(た
だれを除く)
さす・やけどのあとの皮膚のしこ
り・つっぱり(顔面を除く)

ヒロイゼクリーム
喜遠妥®
1ヘパリン類似物質配合

第2類医薬品

30g

手指のあれ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手足のひび・あかぎ
れ、乾皮症、小児の乾燥性皮膚、しもやけ(ただれを除く)
傷・火傷のあとの皮膚のしこり・つっぱり(顔面を除く)

1ヘパリン類似物質配合

A2501

ヒロイゼクリーム
喜遠妥®
ヒロイゼクリーム
喜遠妥®
ヒロイゼクリーム
喜遠妥®



繰り返す乾燥肌に!
ヒロイゼクリーム
喜遠妥®

省資源化のため箱が添付文書を兼ねています。
ご使用に際して、この箱の記載内容を必ず読んでください。また、
必要な時に読めるよう大切に保管してください。

＜外用薬＞
販売名 ヒロイゼクリーム 第2類医薬品

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
- 1. 次の人は使用しないでください。
(1) 出血性血液疾患(血友病、血小板減少症、紫斑病など)の人
(2) わずかな出血でも重大な結果をきたすことが予想される人
(血液凝固抑制作用を有し出血を助長するおそれがあります)
- 2. 次の部位には使用しないでください。
目、粘膜(口腔、鼻腔、膣など)

⊠ 相談すること

- 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(3) 潤滑やただれのひどい人
- 2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、紫斑

3.5〜6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

● 効能・効果

手指のあれ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手足のひび・あかぎれ、
乾皮症、小児の乾燥性皮膚、しもやけ(ただれを除く)、傷・火傷のあとの
皮膚のしこり・つっぱり(顔面を除く)、打ち身・捻挫後のはれ・筋肉痛・関節痛

● 用法・用量

1日1〜数回、適量を患部に擦り込むか、またはガーゼ等にのばして貼ってください。

● 用法・用量に関する注意

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。(2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(3) 外用にのみ使用してください。*出血のある傷口には使用しないでください。(血が止まりにくくなる場合があります。)*顔面にある傷あと、やけどのあとには使用しないでください。(4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

● 成分・分量

(100g中)ヘパリン類似物質 0.3g 添加物:グリセリン、流動パラフィン、スクワラン、プロピレングリコール、ワセリン、グリセリン脂肪酸エステル、パラフィン、マイクロクリスタリンワックス、パラベン、エデト酸Na、ヒアルロン酸Na

● 保管及び取扱い上の注意

- (1) 本剤のついた手で、目などの粘膜に触れないでください。(2) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(3) 小児の手の届かない所に保管してください。(4) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になり品質が変わります。)(5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-9311

販売元 三井薬品株式会社
東京都千代田区神田2-10-2神田ファミビル6階
製造販売元 万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五桂1169-142

三井薬品株式会社「お客様相談室」
電話 03-5809-2790
受付時間 10:00〜17:00
(ただし、土、日、祝日は除きます。)

MADE IN JAPAN

ヘパリン類似物質配合
喜遠妥® ヒロイゼクリーム
第2類医薬品

ヘパリン類似物質配合
喜遠妥® ヒロイゼクリーム
第2類医薬品