

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるように大切に保存して下さい。

<にきび、吹き出物治療薬>


アラジル

ニキビ治療薬


第2類医薬品

- お肌にやさしい弱酸性のクリームです。
- のびがよくべたつきません。
- 2つの有効成分が、にきび、吹き出物を効果的に治療します。
 - ①イブプロフェンピコノール (IPPN) …アクネ菌によるコメドの生成を抑え、炎症を鎮めます。
 - ②イソプロピルメチルフェノール (IPMP) …症状を悪化させるアクネ菌などを殺菌します。

①正常な皮膚




②ニキビ・吹き出物のはじまり



IPPNがコメドの生成を抑制
IPMPがアクネ菌などを殺菌

③ニキビ・吹き出物



IPPNが炎症をしずめる

※コメド=毛穴に皮脂や角質が詰まった状態

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)
次の部位には使用しないでください。 目や目の周囲



相談すること

- ①次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人。
 - (3) 湿潤やただれのひどい人。
 - (4) 患部が広範囲の人。
 - (5) 深い傷やひどいやけどの人。
- ②使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、刺激感(ヒリヒリ感)、はれ(腫脹)、乾燥化(つっぱり感)

- ③1ヶ月位使用しても症状がよくなる場合使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

裏面もお読みください。

【効能】

にきび、吹き出物

【用法・用量】

1日数回、石けんで洗顔後、適量を患部に塗布してください。

(用法及び用量に関連する注意)

- (1) 本剤はにきび、吹き出物のある部位のみに使用し、周辺の広い部分には使用しないでください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 本剤は外用にのみ使用してください。

【成分・分量】

100g中に次の成分を含みます。

成分	分量	はたらき
イブプロフェンビコノール	3.0g	アクネ菌によるcomedoの成長を抑えるとともに、にきびの炎症をしずめます。
イソプロピルメチルフェノール	0.3g	殺菌効果があります。

添加物:ラウリン酸マクロゴール、チオ硫酸Na水和物、エドト酸Na水和物、パラベン、カルボキシビニルポリマー、ジイソプロパノールアミン、オクチルドデカノール

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早く使用してください。

〈発売元・お問い合わせ先〉

明治薬品株式会社

富山県富山市三郷6番地

☎0120-53-3451

受付時間 平日9:00~17:00

〈製造販売元〉

万協製薬株式会社

三重県多気郡多気町五柱1169-142