

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品 コーホーパスパップ*i*

【特長】

1. コーホーパスパップは、インドメタシンを0.5%配合し、痛みの原因物質の生成を抑えることにより、肩の痛み、腰痛、関節痛などに効果をあらわします。
2. コーホーパスパップ*i*は、粘着性に優れた基剤と伸縮自在の不織布を使用していますので、ひじやひざにもよくフィットします。

⚠️【使用上の注意】

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ等)を起こしたことがある人。
(2) ぜんそくを起こしたことがある人。
(3) 15歳未満の小児。
2. 次の部位には使用しないでください
(1) 目の周囲、粘膜等。
(2) 湿疹、かぶれ、傷口。
(3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。
3. 連続して2週間以上使用しないでください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

3.5〜6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。

株式会社 大石膏盛堂

電話 (0942) 83-2112

受付時間 午前9:00〜午後5:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎️ 0120-149-931

【効能・効果】

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、筋肉痛、関節痛、肘の痛み(テニス肘など)、腱鞘炎(手・手首の痛み)、打撲、捻挫

【用法・用量】

表面のプラスチックフィルム(ライナー)をはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。

＜使用方法＞

●片側のフィルムをはがし、薬面を患部に貼り、残りの片側のフィルムをはがします。

●汗でぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 本剤は、痛みやはれなどの原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれなどの症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。
- (3) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い個所に、1〜2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

【成分・分量】

膏体100g中に次の成分を含んでいます。(1枚10g)

インドメタシン・・・0.5g

添加物としてエト酸Na、ポリソルベート80、*l*-メントール、グリセリン、D-ソルビトール、マクロゴール、CMC-Na、カルボキシビニルポリマー、酸化チタン、ポリアクリル酸部分中和物、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、ヒマシ油、pH調整剤、その他2成分を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開封口のチャックを閉めて保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。



製造販売元

株式会社 大石膏盛堂

佐賀県鳥栖市本町1丁目933番地 4

