

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

消炎鎮痛パッチ剤 Pain Relief Gel Patch

第3類医薬品



肩こり

腰痛

筋肉痛

# ユーシップAクール 大判

## 特長

- ユーシップAクールは、サリチル酸メチル、ジフェンヒドラミン塩酸塩などの配合により、打撲、捻挫、筋肉痛などにすぐれた効きめを発揮します。
- ユーシップAクールは、粘着性にすぐれた基剤とタテ・ヨコに伸縮性のある不織布を使用していますので、はがれやすい部位にもピッタリとフィットします。

## △ 使用上の注意

### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。



### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 成分・分量 膏体100g中に次の成分を含んでいます。(1枚40g)

サリチル酸メチル	2.00g
l-メントール	0.625g
dl-カンフル	0.50g
ジフェンヒドラミン塩酸塩	0.02g

添加物としてエデト酸Na、カオリン、カルメロースNa、グリセリン、ゼラチン、D-ソルビトール、尿素、pH調節剤、ヒマシ油、ポリアクリル酸、ポリアクリル酸部分中和物、ポリソルベート80、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、その他1成分を含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 品質保持のため、未使用分はこの袋に入れ、開封口をきちんとしめ、外気にふれないようにして保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

## 効能・効果

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ

## 用法・用量

ライナーをはがし、1日1～2回患部に貼付してください。

### 〈使用方法〉

- (1) 必要であれば包帯、テープ等で止めてください。
- (2) 患部の広さに応じてライナーの上から適当な大きさに切ってお使いください。
- (3) 貼る前に、タテ・ヨコに2～3回軽く伸ばして貼るとよりピッタリ貼れます。

### 〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 患部の皮膚は清潔にし、汗等をよく拭きとってからお貼りください。

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。

株式会社大石膏盛堂 電話 (0942) 83-2112  
受付時間 午前9:00～午後5:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 **株式会社大石膏盛堂**  
佐賀県鳥栖市本町1丁目933番地

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

MADE IN JAPAN

製造番号

使用期限

