

販売名：アンメルツヨコヨク

External Anti-Inflammatory/Analgesic

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (2) ぜんそくを起こしたことがある人
- (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (4) 15才未満の小児

2. 次の部位には使用しないこと

- (1) 目の周囲、粘膜等
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口
- (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部

3. 長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤・かゆみ・はれ、ヒリヒリ感、かぶれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症 状
ショック 〔アナフィラキシー〕	使用後すぐに、皮ふのかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

特 徴

- ① 鎮痛成分フェルビナクが患部に浸透し、急な肩こりの痛みを鎮めます
 - ② 冷感が長持ちする、コールド処方
 - ③ L-メントール6%配合で、爽快な使い心地です
 - ④ 背中まで広がった肩こり痛に届きやすいロングボトル
- *アンメルツシリーズ比

-[成分・分量]100mL中-

フェルビナク 3g
L-メントール 6g
クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.1g
添加物として、グリチルレチン酸、BHT、ジソプロパノールアミン、pH調節剤、プロピレン glycol、エタノール、ユーカリ油、dl-カンフルを含有する

-[用法・用量]-

1日 2~4回、適量を患部に塗布してください

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること
- (2) 外用にのみ使用すること

●塗布部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないこと

●皮ふの特に弱い方は、同じ所に続けて使用しないこと

●ヒリヒリとした刺激が強い場合は、石けんで洗い流すと緩和します

使用に際して、この説明書きを必ずお読みください。また必要なときに読めるよう大切に保管してください
使用期限を過ぎた製品は使用しないこと

—【効能・効果】—

筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛(五十肩など)、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲(うちみ)、捻挫

[保管及び取扱い上の注意]

(1) 直射日光の当たらない温氣の少ない涼しい所(冷暗所)にキャップをしっかりと立てて保管すること

(2) 小児の手の届かない所に保管すること

(3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になつたり品質が変わる)

●キャップをしっかりとしめないと液がもれがある

●衣類に付着した場合には、各衣類の洗濯表示に従って、すみやかに洗うこと

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

＼あつたらいな／をカタチにする

発売元 小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪府中央区道修町4-10

小林製薬 お客様相談室

0120-5884-01
9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 小林製薬株式会社
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

税控除対象

MADE IN JAPAN

火気厳禁 第二石油類 危険等級Ⅲ
エタノール含有物

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931