

この外箱は製品とともに保管し、使用の際には必ずお読みください。

布亀パスE こりと痛みに

第3類医薬品

⚠️ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
- 次の人は使用しないこと
天然ゴムによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 次の部位には使用しないこと
(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。

🗨️ 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

- 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

● 効能又は効果

腰痛、打撲(うちみ)、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労

● 成分及び分量 本品1.0m²(膏体144.81g)中

dL-カンフル	1.80 g
サリチル酸メチル	9.00 g
ハッカ油	1.20 g
ℓ-メントール	4.50 g
トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)	0.50 g
ノニル酸ワニリアマド	0.01 g

添加物として、

ポリブテン、生ゴム、ポリイソブチレン、エステルガム、テルペン樹脂、沈降炭酸カルシウム、酸化チタン、アクリル酸メチル・アクリル酸-2-エチルヘキシル共重合樹脂、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、天然ゴムラテックス、香料、赤色405号、黄色205号を含有します。

外用鎮痛消炎薬
販売名:布亀パスE

● 用法及び用量

1日1～2回、ライナーをはがし、患部に貼ってください。

【用法及び用量に関連する注意】

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- (4) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。
- (5) 入浴時、温度成分による刺激を感じる場合がありますので、入浴の1時間前までには、はがしてください。
- (6) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (7) 皮膚の弱い人は、同じ部位に続けて貼らないでください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 開封後は袋の口を折り曲げ、外箱に入れて保管してください。
- (5) 配置期限を過ぎた製品は使用しないでください。

内容量 大判 12.4cm×7.0cm・10枚入 小判 7.4cm×5.2cm・8枚入
計18枚

発売元 **布亀株式会社** 西宮市今津二葉町3番6号

製造販売元 **大協薬品工業株式会社** 富山市水橋畠等173



お問い合わせ先

大協薬品工業株式会社

お客様相談窓口 電話:076-479-1313

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931