

ご使用の前に、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

外用鎮痛消炎薬 **リョウシン** ジェルテープシクロ

販売名：ジェルテープシクロ

第2類医薬品

△使用上の注意

☒してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2)ぜんそくを起こしたことがある人。(3)妊婦又は妊娠していると思われる人。(4)15歳未満の小児。 2. 次の部位には使用しないこと(1)目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。(3)みずむし・たむし等又は化膿している患部。 3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を併用しないこと 4. 連続して2週間以上使用しないこと

🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること(1)医師の治療を受けている人。(2)他の医薬品を使用している人。(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4)パップ剤でかぶれ等を起こしたことがある人。(5)次の診断を受けた人。消化性潰瘍、血液障害、肝臓病、腎臓病、高血圧、心臓病、インフルエンザ(6)次の医薬品の投与を受けている人。ニューキノロン系抗菌剤、トリアムテレン、リチウム、メトトレキサート、非ステロイド性消炎鎮痛剤、ステロイド剤、利尿剤、シクロスポリン、選択的セロトニン再取り込み阻害剤(7)高齢者。 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、皮膚のあれ、刺激感、色素沈着、水疱、落屑(皮膚片の細かい脱落)

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
接触皮膚炎・ 光線過敏症	貼付部に強いかゆみを伴う発疹・発赤、はれ、刺激感、水疱・ただれ等の激しい皮膚炎症状や色素沈着、白斑があらわれ、中には発疹・発赤、かゆみ等の症状が全身に広がることもある。また日光が当たった部位に症状があらわれたり、悪化することがある。

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能又は効果】

関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫

【用法及び用量】

ライナーをはがし、1日1回患部に貼ってください。ただし、1回あたり2枚を超えて使用しないでください。なお、本成分を含む他の外用剤を併用しないでください。

【用法及び用量に関連する注意】

①15歳未満の小児に使用させないでください。②用法及び用量を厳守してください。③本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。④皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。⑤1回あたり、24時間を超えて貼り続けしないでください。さらに、同じ患部に貼りかえる場合は、その貼付部に発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きていないことを確かめてから使用してください。⑥同じ部位に他の外用剤を併用しないでください。⑦汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用してください。⑧多量の汗をかくことが予想される場合は、膏体がやわらかくなりすぎる可能性がありますので、使用をお控えください。⑨粘着テープ等でかぶれやすい人は使用しないでください。⑩貼付後、はがす際にまれに粘着テープと膏体が分離する場合があります。

【成分及び分量】 膏体100g(1000cm²)中

シクロフェナクナトリウム…1.000g 添加物として、D-ソルビトール液、濃グリセリン、ポリアクリル酸部分中和物、ゼラチン、カオリン、カルメロースナトリウム、カルボキシビニルポリマー、アクリル酸メチル・アクリル酸-2-エチルヘキシル共重合樹脂、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、L-メントール、ポリソルベート80、亜硫酸水素ナトリウム、pH調整剤、ジヒドロキシアルミニウム アミノアセテート、エタノール、酸化チタン、モノオレイン酸ソルビタンを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

①直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。②小児の手の届かない所に保管してください。③他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)。④開封後はチャックを閉めて保管してください。⑤使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先 株式会社富山常備薬

☎0120-137-093 受付時間:9時～18時(年中無休)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

☎0120-149-931

セルフメディケーション

税 控除 対象

T14



4 580544 060204

〈製造販売元〉大協薬品工業株式会社
富山県富山市水橋畠等173

〈発売元〉株式会社富山常備薬
富山県富山市丸の内1-8-17