

使用前にこの説明書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

消炎鎮痛プラスター  
販売名：**リサインパス**

第3類医薬品

**⚠ 使用上の注意**

**❌ してはいけないこと**

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
- 1. 次の人は使用しないこと  
天然ゴムによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2. 次の部位には使用しないこと  
(1)目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。

**🗉 相談すること**

- 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - 2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- | 関係部位 | 症 状       |
|------|-----------|
| 皮膚   | 発疹・発赤、かゆみ |
- 3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

**効能又は効果**

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ

**用法及び用量**

- 1日1～2回ライナーをはがし、患部に貼って下さい。
- (用法及び用量に関連する注意)
- (1)用法及び用量を厳守して下さい。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用して下さい。
- (3)汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用して下さい。
- (4)皮膚の弱い人は、使用前に顔の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用して下さい。
- (5)皮膚の弱い人は、同じ部位に続けて貼らないで下さい。

1枚(6.2cm×4.2cm)

お問い合わせ先  
大協薬品工業株式会社  
お客様相談窓口 電話 076-479-1313  
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

MADE IN JAPAN

**成分及び分量 膏体100g中**

|               |        |
|---------------|--------|
| dL-カンフル       | 1.243g |
| サリチル酸メチル      | 6.215g |
| ハッカ油          | 0.829g |
| ノメソール         | 3.108g |
| トコフェロール酢酸エステル | 0.345g |

添加物として、ポリブテン、生ゴム、ポリインプレン、エステルガム、テルペン樹脂、沈降炭酸カルシウム、酸化チタン、アクリル酸メチル・アクリル酸-2-エチルヘキシル共重合樹脂、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、天然ゴムラテックス、香料、赤色405号、黄色205号を含有します。

**保管及び取扱い上の注意**

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい(誤用の原因となったり品質が変わります。)
- (4)開封後は、添付の保存袋に入れて保管して下さい。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

発 売 元 **株 式 会 社 タ カ ミ ツ**  
名古屋市中区上区町東町4の68の1  
製造販売元 **大協薬品工業株式会社**  
富山市水橋町 173

takamitsu

# 肩こり 筋肉痛 腰痛

ビタミンE配合

肌にやさしい貼りごち  
痛みに浸透して効く!

副作用被害救済制度  
電話 0120-149-931

140枚入 **保存袋付**  
サイズ(6.2cm×4.2cm)

takamitsu

サイズ(6.2cm×4.2cm) **保存袋付**

# 肩こり 筋肉痛・腰痛

ビタミンE配合

肌にやさしい貼りごち 痛みに浸透して効く!

ムレにくい  
穴あきタイプ

消炎鎮痛プラスター  
**リサインパス** 第3類医薬品 140枚入

takamitsu

痛みに浸透して効く!

ビタミンE配合



肩こり



腰痛



筋肉痛

140枚入 **保存袋付**  
サイズ(6.2cm×4.2cm)

消炎鎮痛プラスター



T21