かゆみ、虫さされに

目立たない！

臭わない！

かゆいところに貼るだけ！


かきむしり防止
直径25㎜
イメージ図

かゆみ止めパッチS

セルフメディケーション 税控除対象

第2類医薬品

36枚入

虫さされ、かゆみに かゆみ止めパッチS 第2類医薬品

D1

虫さされ、かゆみに かゆみ止めパッチS 第2類医薬品

かゆみ止めパッチS 第2類医薬品

製造番号

使用期限（西暦年月）

使用に際してこの説明書をよく読むこと。また、必要なときに読めるよう大切に保管すること。

【特　徴】

- ●かゆみ止めパッチSは、かゆいところにペタンと貼るだけで、かゆみをおさえるパッチです。かき傷も防げます。

⚠使用上の注意

☒ **してはいけないこと** （守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

次の部位には使用しないこと

（1）目の周囲、粘膜等。（2）湿疹、かぶれ、傷口。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
   （1）医師の治療を受けている人。
   （2）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
   （3）湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症　状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】虫さされ、かゆみ、しもやけ

【用法・用量】パッチをライナーからはがし、1日数回患部に貼付する。

〈用法・用量に関連する注意〉

（1）用法・用量を厳守すること。
（2）小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
（3）外用にのみ使用すること。
（4）汗をかいたり、皮膚がぬれているときは、よくふき取ってから使用すること。
（5）皮膚の弱い人は、本剤を同じ所に続けて使用しないこと。

【成分・分量】膏体100g中

ジフェンヒドラミン	1.0g
リドカイン	2.0g
イソプロピルメチルフェノール	1.0g
サリチル酸グリコール	1.0g

添加物として、スチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体、脂環族飽和炭化水素樹脂、ポリブテン、BHT、流動パラフィン、その他2成分を含む。

【保管及び取扱い上の注意】

（1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
（2）小児の手の届かない所に保管すること。
（3）他の容器に入れ替えないこと。未使用分はもとの袋に入れ、開封口をきちんと折り曲げて保管すること。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
（4）使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

［包　装］36枚入（18枚×2袋）（直径25㎜の円形）

〈お問い合わせ先〉
本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。
帝國製薬株式会社　お客様相談室
電話（0879）25-2363
受付時間
9：00～17：00（土・日・祝日を除く）

副作用被害救済制度 ☎0120（149）931

販売名　かゆみ止めパッチS
帝國製薬株式会社
香川県東かがわ市三本松567番地

ここを押して開けて下さい

紙

第2類医薬品

4 987373 074950

帝国製薬					様	かゆみ止めパッチS36枚入									
訂正・出力	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
日付	2021. 11.16														
担当者	松永														
色数	🟨🟪🟦⬛							特記事項							4S_0320