

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

### ⚠ 使用上の注意

**❌ してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

次の部位には使用しないでください。  
(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。



### ■ 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人。
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - 湿潤やただれのひどい人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- 本品を5～6日間使用しても症状がよくなる場合場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

**【用法及び用量】** パッチをライナーからはがし、1日数回患部に貼付してください。  
**〈用法及び用量に関連する注意〉**

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 外用にのみ使用してください。
- 汗をかいたり、皮膚がぬれているときは、よくふき取ってから使用してください。
- 本剤を同じ所に長時間続けて使用しないでください。

**【成分及び分量】** 膏体 100g中

ジフェンヒドラミン・・・・・・・・・・ 1.0g  
イソプロピルメチルフェノール・・・・・・ 1.0g  
トコフェロール酢酸エステル・・・・・・ 0.5g  
l-メントール・・・・・・・・・・・・ 3.0g



添加物としてスチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体、脂環族飽和炭化水素樹脂、ハイスポリイソプレンゴム、BHT、流動パラフィン、その他2成分を含有します。※本剤にはステロイドを含んでおりません。

**【保管及び取り扱い上の注意】**

- 小児の手の届かない所に保管してください。(2) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えしないでください。未使用分はもとの袋に入れ、開封口をきちんと折り曲げて保管してください。(誤用の原因になることや品質が変わることを防ぐため。)(4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。(5) 開封後は、使用期限に関わらず、できるだけ早めに使用してください。

販売名: かゆみ止めパッチLM **第3類医薬品**

**【包装】** 80枚入(20枚×4袋) (直径3cmの円形)

**【効能又は効果】** 虫さされ、かゆみ、しもやけ



副作用被害救済制度  
☎0120(149)931

MADE IN JAPAN



P

発売元

株式会社ドン・キホーテ  
東京都目黒区青葉台2-19-10

製造販売元

帝國製薬株式会社  
香川県東かがわ市三本松567番地

〈お問い合わせ先〉

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。  
帝國製薬株式会社 お客様相談室  
電話(0879)25-2363 受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)