

ご使用に際し、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

インドメタシン配合

第2類医薬品

# ラクールID1%クリーム

経皮吸収型鎮痛消炎剤

ラクールID1%クリームはインドメタシンを主成分とした、局所の痛みを抑える製剤です。

インドメタシンには鎮痛消炎作用があり、腰、関節、肩、筋肉などの痛みをとる働きがあります。ラクールID1%クリームを痛みのある部分に塗ることにより、インドメタシンが皮膚から吸収され、痛みの原因に直接作用し、効果を発揮します。

## 特長

- 痛みをおさえるインドメタシンが直接皮膚から吸収されます。
- 運動後や疲労時における腰、関節、筋肉などの局所の痛みをおさえます。
- 塗ったときにのびがよく、刺激を抑えた製剤です。

## △ 使用上の注意

**⊗ してはいけないこと**（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

- 次の人は使用しないでください  
(1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(2) ぜんそくを起こしたことがある人。
- 次の部位には使用しないでください  
(1) 目の周囲、粘膜等。  
(2) 湿疹、かぶれ、傷口。  
(3) みずむし・たむし等または化膿している患部。
- 長期連用しないでください



### 相談すること

- 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦または妊娠していると思われる人。  
(3) 本人または家族がアレルギー体質の人。  
(4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師または薬剤師に相談してください  
(1) 使用後、次のような症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発赤・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

## 【効能・効果】

筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

## 【用法・用量】

1日4回を限度として適量を患部に塗擦してください。

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 11歳未満の小児には使用させないでください。
- (2) 11歳以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。
- (5) 1週間当たり50gを超えて使用しないでください。
- (6) 薬剤塗擦後の患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。
- (7) 定められた用法・用量をお守りください。

## 【成分・分量】

100g中

インドメタシン.....1,000mg

β-メントール.....3,000mg

添加物：ミリスチン酸イソプロピル、エタノール、ジイソプロパノールアミン、エデト酸Na、オキシベンゾン、パラベン、カルボキシビニルポリマー、スクワラン、アジピン酸ジイソプロピル、ハアセチルショ糖、ポリオキシエチレンセチルエーテル

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)。
- (4) 本剤のついた手で、目などの粘膜にふれないでください。
- (5) 使用期限(外箱及びチューブに記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

## お問い合わせ先

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店または下記までご連絡いただけますようお願い申し上げます。

東光薬品工業株式会社 お客様相談室 電話 03-3855-0101

受付時間 午前 9:00~午後 5:00 (土・日・祝日を除く)



発売元  
東光クリエート株式会社  
東京都足立区廣田1丁目9番14号



製造販売元  
東光薬品工業株式会社  
東京都足立区廣田2丁目16番21号