RAKOOL
第2類医薬品

ラクール
経皮鎮痛消炎剤
ラクペタンDX® パップ

7枚入（7枚×1袋） 保湿ファスナー付
1枚 10cm×14cm

RAKOOL

ジクロフェナクNa1%

第2類医薬品

ラクール
経皮鎮痛消炎剤
ラクペタンDX® パップ

保湿ファスナー付
7枚入（7枚×1袋）
1枚 10cm×14cm

肩、腰、筋肉の
痛みに!

ひんやり冷感!
全方向伸縮タイプ

RAKOOL
第2類医薬品
ラクール
経皮鎮痛消炎剤
ラクペタンDX® パップ
7枚入（7枚×1袋） 保湿ファスナー付
1枚 10cm×14cm

RAKOOL
第2類医薬品
ラクール
経皮鎮痛消炎剤
ラクペタンDX® パップ
7枚入（7枚×1袋） 保湿ファスナー付
1枚 10cm×14cm

RAKOOL
第2類医薬品
ラクール
経皮鎮痛消炎剤
ラクペタンDX® パップ
7枚入（7枚×1袋） 保湿ファスナー付
1枚 10cm×14cm

A

A1

III

ご使用に際し、この説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

ご使用上の注意

1. 次の人は使用しないでください

(ぜんそくを起こしたことがある人)

(1) 本剤または本剤の成分であるジクロフェナクNaに対してアレルギー症状を起こしたことがある人。

(2) ひどい喘息のある人。

(3) 胃・十二指腸潰瘍、出血性大腸炎、クローン病、潰瘍性大腸炎、重篤な肝機能不全、重篤な腎機能不全、心不全、高度な高血圧症、脳血管障害、虚血性心疾患、血液凝固異常、出血傾向のある人。

(4) 妊娠末期の人。

(5) 15歳未満の小児は使用しないでください。

○ラクペタンフィルムは使用しないでください。

2. 使用中または使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、皮膚のあれ、刺激感、色素沈着、水泡、落屑（皮ふの細かい脱落）

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください

症状の名称	症状
ショック（アナフィラキシー）	使用後すぐに、息のつまり感、くび・まぶた、声のかすれ、しゃっき、のどのつまり感、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。
皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）	陽性部位に強いかゆみを伴う発疹・発赤、はれ、刺激感、水泡、ただれ等の激しい皮膚症状や色素沈着等が長期（目安として1週間）にわたり、中には発熱・発疹、かゆみ等の症状が全身に広がることがあります。また、目が腫れたり、ただれたりして症状があらわれたり、悪化することがあります。

3. 5～6日間使用しても症状が良くならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

[効能・効果]

関節痛、腰じょう痛その緩和、腰椎捻挫（ぎっくり腰）、肩の痛み（ひどい方向をむき）、筋肉痛、腱鞘炎、捻挫

[用法・用量]

○ラクペタンフィルムは使用しないでください。ただし、1回当たり2枚を超えて使用しないでください。なお、未成分を含む他の外用剤も併用しないでください。

<使法・用量に関連する注意>(1) 定められた用法・用量を必ず守ってください。(2) 1回あたり、2時間間隔を空けてください。さらに同じ患部に貼り伸ばす場合は、その貼付部に発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きていないことを確認のうえ使用してください。(3) 本剤は、麻酔やはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、麻酔やはれ等の症状の一時的な緩和を目的として使用してください。(4) ステロイド剤、患部が熱ただれ状態であり使用しないでください。(5) 皮ふの弱い人には、使用前に腕の内側の皮ふの弱い部所に、1～2cm角のパッチを目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確認のうえから使用してください。(6) 同じ部位に他の外用剤を併用しないでください。

[成分・分量（薬体1000g中）] 1枚10cm×14cm, 薬体重1.4g

ジクロフェナクナトリウム…1g　添加物:BHT,ポリビニルアルコール(部分けん化物),ポリアクリル酸部分中和物,D-ソルビトール,グリセリン,ポリソルベート80,ケイ酸アルミニウム

[保管及び取扱上の注意]

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2) パップの手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)(4) 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開口部のファスナーを閉じて保管してください。(5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

製造番号

使用期限

4 9874355574022

発売元
ラクール薬品販売株式会社
東京都荒川区東尾久1丁目9番14号

TOKO 製造販売元
東光薬品工業株式会社
東京都足立区新田2丁目16番23号

（お問い合わせ先）
(独)薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/english/index.html
<電話>0120-149-931（フリーダイヤル）

ラクール薬品販売株式会社
フリーダイヤル 0120-86-8998

ご使用前に必ずお読みください。