

【効能・効果】

肩こり、腰痛、関節痛、筋肉疲労、筋肉痛、打撲、捻挫

【成分・量】100mL中

サリチル酸グリコール…2,500mg
l-メントール…3,000mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩…100mg
ニコチニ酸ベンジルエステル…10mg
ノニル酸ワニリルアミド…12mg
添加物: ハーアセチルしょ糖、エタノール、プロピレンジリコール

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)本剤のついた手で、目などの粘膜にふれないでください。
- (5)火気に近づけないでください。
- (6)メガネ、時計、アクセサリーなどの金属類、化織の衣類、プラスチック類、床や家具などの塗装面等に付着すると変質することがありますので、付着しないよう注意してください。
- (7)使用期限(容器に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

製造番号

使用期限



ラクールS
ローション

100mL

肩こりなどの痛みに
サリチル酸グリコールが効く
爽快な塗りごこち

肩こり 腰痛・打ち身に

薬のはたらき

肩こり

腰 痛

関節痛

筋肉疲労

筋肉痛

打 撲

サリチル酸グリコール：
2,500mg

・腫れや熱感などの炎症を鎮め、痛みを抑えます

l-メントール：3,000mg

・清涼感による刺激と軽い知覚麻痺で痛みを抑えます

クロルフェニラミンマレイン酸塩：
100mg

・腫れや赤みなどの炎症を抑えます

ニコチニ酸ベンジルエステル：
10mg

・血行不良を改善し、肩こりや筋肉痛に効果を発揮します

ノニル酸ワニリルアミド：
12mg

100mL中

第3類医薬品

【用法・用量】

1日数回、適量を患部に塗布してください

【用法・用量に関する注意】

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3)外用にのみ使用してください。
- (4)入浴前後1時間の使用はさけてください。

- (5)皮膚の弱い人は、同じところに続けて使用しないでください。

- (6)汗をかいたときなど、本剤による刺激を強く感じる場合がありますので、激しい痛みなどを感じた場合には、使用を中止し、よく泡立てた石けんでやさしく洗い、水で流した後、よく干してください。

- (7)塗布した患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。

- (8)塗布前にスポンジ面を患部に押し当て、薬液がスポンジに浸透していることを確認してください(スポンジが乾いたまま塗布するとスポンジが破れることがあります)。

発売元
東光クリエート株式会社

東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

製造販売元

東光薬品工業株式会社

東京都足立区新田2丁目16番23号

◆お問い合わせ先◆
お客様相談窓口 03-3855-0101

第3類
医薬品

ここから
開けてください

ラクールSローション

- つらい肩こりでお悩みの方
- 手を汚さず使用したい方
- 塗った後、すぐに衣類を着たい方



この説明文書は、ご使用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

[使用上の注意]

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1.次の部位には使用しないでください

- (1)目の周囲、粘膜等。
- (2)しつしん、かぶれ、傷口。

相談すること

1.次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、痛み

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

*この商品は(株)マツモトキヨシホールディングスのオリジナル商品です。

副作用被害救済制度 電話 0120-149-931

