

ご使用に際して、この説明書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第3類医薬品

# 肩こり・腰痛・筋肉痛

## 患部をクールダウン

### 鎮痛消炎剤 サリコル冷感

30枚入 1枚サイズ 10cm×14cm

#### 【特長】

- 微香性で、消炎作用と鎮痛作用のあるパップ剤です。
- 伸縮性がよく、肌にぴったりとフィットします。
- 肘や膝などの関節に貼っても、はがれにくい。

ここを押して開けて下さい。

#### ⚠ 使用上の注意

**❌ してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の部位には使用しないで下さい。  
(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。



#### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。  
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

#### 【効能・効果】

打撲、捻挫、筋肉痛、肩こり、腰痛、関節痛、しもやけ、筋肉疲労、骨折痛

#### 【用法・用量】

表面のプラスチックフィルムをはがし、1日1～2回患部に貼付して下さい。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を守って下さい。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用して下さい。
- (3) 患部が汗等で濡れている時は、よく拭いて下さい。

#### 【成分・分量】 膏体100g(1000cm<sup>2</sup>)中

成 分	分 量	はたらき
ℓ-メントール	0.5g	炎症を抑えます
dℓ-カンフル	0.5g	
サリチル酸グリコール	1.5g	痛みをやわらげます
トコフェロール酢酸エステル	0.3g	末梢の血行をよくします

添加物：ゼラチン、エデト酸ナトリウム水和物、ポリソルベート80、カオリン、酸化チタン、濃グリセリン、D-ソルビトール、ホリアクリル酸部分中和物、ヒマシ油、カルメロースナトリウム、pH調節剤、その他2成分含有

#### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。  
(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4) 未使用分はもとの袋に入れ、チャックをきちんと閉めて下さい。  
使用期限内であっても開封後はなるべく早く使用して下さい。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

〈ご相談窓口〉

お買い求めのお店又は下記窓口まで  
東和製薬株式会社  
☎(0736)64-2567  
時間9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

製造販売元：東和製薬株式会社  
和歌山県紀の川市貴志川町丸瀬1229番地

使用期限

製造番号



02

