

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

インドメタシン0.5%配合 温感パッピ剤

肩の痛み・腰痛・関節痛  
**サンリールパップVH**

特 長

- 医療用に使われている鎮痛消炎成分のインドメタシンが、痛みの原因となる物質の生成を抑え、腰痛、関節痛などの痛みを伴う症状に優れた効果を発揮します。
- トウガラシエキスの働きで、患部の血行を促進し日々の痛みやこりをやわらげます。

鎮痛消炎パッピ剤

第2類医薬品

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと [ 守らないと現在の症状が悪化したり  
副作用が起こりやすくなります。 ]

1. 次の人は使用しないで下さい。  
(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。  
(2)ぜんそくを起こしたことがある人。(ぜんそくを起こしたことがある人はインドメタシン等の抗炎症剤を使用するとぜんそく発作を誘発することがあります。)  
(3)15歳未満の小児。
2. 次の部位には使用しないで下さい。  
(1)目の周囲、粘膜等。  
(2)湿疹、かぶれ、傷口。  
(3)みずし・たむし等又は化膿している患部。  
3. 連続して2週間以上使用しないで下さい。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。  
(1)医師の治療を受けている人。  
(2)妊娠又は妊娠していると思われる人。  
(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。  

| 関係部位 | 症 状                          |
|------|------------------------------|
| 皮 肌  | 発疹・発赤、かゆみ、はれ、痛み、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感 |
3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

18枚入

10cm×14cm

用法・用量

15歳以上 表面のプラスチックフィルムをはがし、1日2回を限度として患部に貼付して下さい。  
15歳未満 使用しないで下さい。

<用法・用量に関する注意>

- (1)用法・用量を厳守して下さい。
- (2)本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用して下さい。
- (3)汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用して下さい。
- (4)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を自安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用して下さい。
- (5)打撲(うちみ)、捻挫に使用する場合には、患部の熱感等の症状がおさまってから使用して下さい。
- (6)本剤を使用してから汗をかくと刺激を感じることがあります。
- (7)本剤に触れた手で、目の周囲、口唇、鼻孔、その他の粘膜にさわらないで下さい。
- (8)本剤を貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないで下さい。
- (9)本剤を貼ったまま、あるいは剥した直後に入浴しないで下さい。(強い刺激を感じことがありますので、少なくとも入浴の1時間前には剥がし、入浴後は30分程してから使用して下さい。)

成分・分量 膏体100g (1000cm<sup>2</sup>) 中

| 成 分      | 分 量                     |
|----------|-------------------------|
| インドメタシン  | 0.5g                    |
| トウガラシエキス | 0.075g(日局トウガラシ3.75g相当量) |

添加物：ゼラチン、エデト酸ナトリウム水和物、マクロゴール、ポリソルベート80、l-メントール、カオリン、酸化チタン、濃グリセリン、D-ソルビトール、ヒマシ油、ポリアクリル酸部分中和物、カルメロースナトリウム、pH調節剤、赤色106号、その他2成分含有

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。  
(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4)未使用分はもとの袋に入れ、チャックをきちんと閉めて下さい。使用期限内であっても開封後はなるべく早く使用して下さい。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

製造販売元：東和製薬株式会社  
和歌山県紀の川市貴志川町丸柄1229番地

副作用被害救済制度 電話0120-149-931(フリーダイヤル)

〈ご相談窓口〉  
お問い合わせのお店  
又は下記窓口まで  
東和製薬株式会社  
(お客様相談窓口)  
☎ 0120-108-871  
時間 9:00~17:30  
(土・日・祝日を除く)

使用期限

製造番号

4 987450 001824



紙  
02