

開け口

フジアロー[®]-DX (鎮痒消炎薬)

第②類医薬品

商品詳細へ



ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないこと (1) 水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部 (2) 目の周囲、粘膜等 2. 顔面には、広範囲に使用しないこと 3. 長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (4) 患部が広範囲の人 (5) 湿潤やただれのひどい人 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮膚 (患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3.5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 火気に近づけないこと
- (5) 次の物には付着させないこと(変質又は変色する場合がある) 床や家具等の塗装面、メガネ、時計、アクセサリ類、プラスチック類、化繊製品、皮革製品等
- (6) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。また、開封後は使用期限内であってもなるべく早く使用すること
- (7) 使用後はキャップをしっかりと締め、容器を立てて、保管すること

火気厳禁

第二石油類 危険等級Ⅲ 水溶性
エタノール含有物 45mL

発売元：株式会社 **富士薬品**
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地

お問い合わせ先
株式会社 富士薬品(学術室)
☎048-648-1118
9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元：東和製薬株式会社
和歌山県紀の川市貴志川町丸栖1229番地



つらいかゆみに フジアロー[®] DX

かゆみ 虫さされ

デキサメタゾン酢酸エステル



スーツと
クール
タイプ

液剤 45mL

セルフメディケーション
税 控除 対象

富士薬品 第②類医薬品

効能・効果

かゆみ、虫さされ、皮ふ炎、かぶれ、じんましん、しっしん、しもやけ、あせも

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を守ること
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用すること
- (3) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること
- (4) 外用にのみ使用すること

※塗布部を肌に当てて軽く押し、塗布部に薬液をしみ込ませてから、患部に軽く塗ってください。

成分・分量 <100mL中>

デキサメタゾン酢酸エステル	0.025g
ジフェンヒドラミン塩酸塩	2.0g
l-メントール	3.5g
dl-カンフル	2.0g
グリチルレチン酸	0.2g
イソプロピルメチルフェノール	0.1g

添加物：マクロゴール、プロピレングリコール、ラウロマクロゴール、クエン酸水和物、クエン酸Na水和物、ジブチルヒドロキシトルエン、ハアセチルしょ糖、エタノール 含有



4 987524 106714