



開け口

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

▲ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください。(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、外用鎮痛消炎薬を使用してぜんそくを起こしたことがある人 (3) 15才未満の小児 2. 次の部位には使用しないでください。(1) 目の周囲、粘膜炎等 (2) 皮膚の弱い部位 (顔、わきの下等) (3) 湿疹、かぶれ、傷口 (4) みずむし、たむし等又は化膿している患部 3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を使用しないでください。4. 連続して2週間以上使用しないでください。(本剤は痛みを一時的におさえるものです。痛み等の症状が継続する場合には、使用を中止し、医師の診察を受けてください。)

🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などにアレルギー症状を起こしたことがある人 (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (4) 高齢者 (5) 次の診断を受けた人 気管ぜんそく

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありしますので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|--------------------------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱、色素沈着 |
| 消化器 | 胃部不快感、みぞおちの痛み |
| その他 | むくみ |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|--------------------|---|
| ショック (アナフィラキシー) | 使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。 |

3. 使用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。下痢・軟便

4. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(他の疾患の可能性があります)

お問い合わせ先 株式会社 富士薬品 (学術室)
☎048-648-1118 9:00～17:30(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所にキャップをしっかりと閉めて保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 火気に近づけないでください。
- (5) メガネ、時計、アクセサリー等の金属類、繊維の衣類、プラスチック類、床や家具等の塗装面等に付着すると変質又は変色することがありますので、付着しないように注意してください。
- (6) 本剤が衣類や寝具等に付着し、濡れた場合にはなるべく早く水か洗剤で洗い落としてください。
- (7) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。

火気厳禁

第二石油類 危険等級Ⅲ
水溶性エタノール
含有物 50g

外用鎮痛消炎薬
販売名:
サンツールLX液α

第2類医薬品

内容量 50g

01

ここから開けると箱が全開になります

つらい痛み^①に直接浸透
サンツール[®]
LX液α

肩の痛み・腰痛
筋肉痛・腱鞘炎

ロキソプロフェン[®]
ナトリウム水和物^②
+
メントール



セルフメタケーション

税 控除 対象

富士薬品

液剤 50g

外用鎮痛消炎薬

第2類医薬品

効能・効果

関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)

用法・用量

1日3～4回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量をお守りください。
- (2) 使用部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。
- (3) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。
- (4) 1回あたり約2g(塗布面積:手のひら約10枚分)、1週間あたり50gを超えて使用しないでください。
- (5) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医師の診察を受けてください。
- (6) 外用にのみ使用してください。

※ 塗布部に肌を当てて軽く押し、塗布部に薬液をすみ込ませてから、患部に軽く塗ってください。

成分・分量 <100g中>

ロキソプロフェンナトリウム水和物

1.13g(無水物として1g)

メントール 3.0g

添加物: マコロンゴール、クエン酸Na水和物、クエン酸水和物、ヒプロメロローズ、エタノール 含有



4 987524 106516

製造販売元: 東和製薬株式会社
和歌山県紀の川市善志川町丸栢1229番地

発売元: 株式会社 富士薬品
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地