

つらい関節、筋肉の痛みに深く浸透効いていく!

日本薬局方フェルビナクパップ

フェイスシップ®

フェルビナク配合シップ剤

商品の特長

- 優れた抗炎症・鎮痛効果のある「フェルビナク」を1枚あたり70mg配合した鎮痛消炎シップ剤です。
- 「フェルビナク」は痛みに関係する物質(プロスタグランジン)の生成を抑え、腰・肩・関節・筋肉の痛みに優れた効きめを発揮します。
- 優れた冷却力が持続し、炎症をすみやかに抑える事ができます。
- シップの角を丸くする事で衣類に引っかからず、はがれにくくなりました。
- 伸縮自在で、関節部位にもぴったりフィット。
- 左右に引っばるだけでフィルムがはがせる「バリピタシート®採用」なので、どんな部位でも簡単に貼る事ができます。
- 1枚ずつ取り出しやすく、コンパクトな包材の「ポケシップ®」です。

**⚠️ [使用上の注意]**

❌ してはいけないこと [守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。]

1. 次の人は使用しないでください。

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) ぜんそくを起こしたことがある人。
- (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (4) 15歳未満の小児。

2. 次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。
- (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。

3. 連続して2週間以上使用しないでください。

🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ、ヒリヒリ感、かぶれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

【効能・効果】 肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みとはれ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、ねんざ

【用法・用量】 1日2回を限度として、患部に貼ってください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 15歳未満の小児に使用させないでください。
- (2) 定められた用法・用量を守ってください。
- (3) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。
- (4) 患部の皮膚は清潔にして貼ってください。

【成分・分量】

成分	含量(膏体100g中)
フェルビナク	0.7g

添加物として、エデト酸ナトリウム水和物、N-メチル-2-ピロリドン、*l*-メントール、グリセリン、ケイ酸Al、酸化チタン、酒石酸、ゼラチン、ポリアクリル酸部分中和物、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、メタケイ酸アルミン酸Mg、その他3成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光や高温をさけ、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。
- (4) 使用期限を過ぎた商品は使用しないでください。
- (5) 開封後は中身の乾燥を防ぐためしっかりとシールを閉めてください。

《包装》10cm × 14cm …………… 10枚入

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

製造販売元  **久光製薬株式会社** 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地 <https://www.hisamitsu.co.jp>

お客様相談室：TEL.0120-133250 受付時間／9:00—17:50(土日・祝日・会社休日を除く)

1枚ずつ
取り出しやすい
ポケシップ®



当社従来品に比べて
薬袋のプラスチック
使用量を減らしました。

Hisamitsu

10 枚入
サイズ:10cm×14cm

フェイタス® シップ® 冷感

フェルピナク配合シップ®剤 第2類医薬品

関節・筋肉 **痛み** 直接浸透

シップの端からはがれにくい



ピットリフィット!
全方向伸縮自在!

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

久光製薬株式会社 お客様相談室: TEL.0120-133250
〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地 受付時間 / 9:00-17:50
https://www.hisamitsu.co.jp (土日・祝日・会社休日を除く)

▲当社HELLO!ecolプロジェクトの詳細はこちら。副作用被害救済制度: ☎0120-149-931

微香性

モロヘイヤ・アロエ

（既）経皮剤

お客様アンケート

商品情報は

こちらへ▼

QRコード

QRコード

効能・効果

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎（手・手首・足首の痛みとは別）、肘の痛み（テニス肘など）、打撲、ねんざ

用法・用量

1日2回を限度として患部に貼付してください。

（用法・用量に関連する注意）

(1)15歳未満の小児に使用させないでください。(2)定められた用法・用量を守ってください。(3)本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。(4)患部の皮膚は清潔にして貼ってください。

成分・分量（膏体100g中）

フェルピナク.....0.7g

添加物として、エデト酸ナトリウム水和物、N-メチル-2-ピロリドン、β-メントール、グリセリン、ケイ酸Al、酸化チタン、雲石炭、セラチン、ポリアクリル酸部分中和物、ポリビニルアルコール（部分けん化物）、メタケイ酸アルミン酸Mg、その他3成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります）。(4)使用期限を過ぎた商品は使用しないでください。(5)開封後は中身の乾燥を防ぐためしっかりとシールを閉めてください。

【ご使用方法】○表面のシールを開け口のところから開け、1枚ずつ取り出してお使いください。○中身の乾燥を防ぐため、使用後はシールを元のようにしっかりと閉めてください。



4 987188 123980

製造番号

使用期限

袋 : PE, M, PET
シールふた : PET, PP 4E180M

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要なときにすぐ読めるように大切に保管してください。

包装10枚(10cm×14cm)
日本薬局方 フェルピナクシップ
販売名: フェイタス®シップ

第2類医薬品

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと
守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。

1. 次の人は使用しないでください。(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2)ぜんそくを患ったことがある人。(3)妊婦又は妊娠していると思われる人。(4)15歳未満の小児。2. 次の部位には使用しないでください。(1)目の周囲、粘膜等。(2)遊休、かぶれ、傷口。(3)みずむし・たむし等又は化膿している患部。3. 連続して2週間以上使用しないでください。

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。(1)医師の治療を受けている人。(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性が有りますので、直ちに使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位 症状
皮膚 発疹・発赤、はれ、かゆみ、ヒリヒリ感、かぶれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称 症状
ショック(アナフィラキシー) 使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、虚汗の発汗等があらわれます。

3. 5~6日間使用しても症状がよくなりません場合は使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。