


1枚ずつ  
取り出しやすい  
ポケシップ®



シップの  
サイズ  
そのまま



当社従来品に比べて  
薬袋のプラスチック  
使用量を減らしました。

Hisamitsu

10枚入  
サイズ:10cm×14cm

# フェイタス シップ 温感

フェルビナク配合シップ剤 第2類  
医薬品

関節・筋肉 **痛み** 直接浸透

シップの端からはがれにくい



丸かど®シップ

ピッタリフィット!  
全方向伸縮自在!

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記のお客様相談室までお願い申し上げます。

久光製薬株式会社

〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地  
https://www.hisamitsu.co.jp

▲当社HELLO!ecoプロジェクトの詳細はこちらへ。副作用被害救済制度: ☎0120-149-931

お客様相談室: TEL.0120-133250  
受付時間 / 9:00-17:50  
(土日・祝日・会社休日を除く)

微香性

セルフメディケーション  
税 控除 対象

お客様アンケート  
商品情報は  
こちらへ▼



効能・効果

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みとはれ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、ねんざ

用法・用量

1日2回を限度として患部に貼付してください。

(用法・用量に関連する注意)

(1) 15歳未満の小児に使用させないでください。(2) 定められた用法・用量を守ってください。(3) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。(4) 貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。(5) 強い刺激を感じる場合がありますので、入浴の1時間前には本剤をはがしてください。また、入浴後は30分位してから使用してください。(6) 患部の皮膚は清潔にして貼ってください。(7) 皮膚の弱い人は同じ所には続けて貼らないでください。(8) 打撲、ねんざ等に本剤を使用する場合は、はれがひいてから使用してください。

成分・分量(膏体100g中)

フェルビナク.....0.7g  
トウガラシエキス.....0.1g  
(原薬換算1.25g)

添加物として、エトド酸ナトリウム水和物、N-メチル-2-ピロリドン、β-メントール、グリセリン、ケイ酸Al、酸化チタン、澱石酸、セラチン、ポリアクリル酸部分中和物、ポリビニルアルコール(部分けん化)、メタケイ酸アルミン酸Mg、その他3成分を含有します。

保管及び取扱上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。(4) 使用期限を過ぎた商品は使用しないでください。(5) 開封後は中身の乾燥を防ぐためしっかりとシールを閉めてください。

【ご使用方法】○表面のシールを開け口のところから開け、1枚ずつ取り出してお使いください。○中身の乾燥を防ぐため、ご使用後はシールを元のようにしっかりと閉めてください。



4 987188 123997

製造番号

使用期限



袋 : PE, M, PET

シールふた : PET, PP 4E181M

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要に応じてよく読めるように大切に保管してください。

包装 10枚(10cm×14cm)  
販売名: フェイタス®シップ温感

第2類医薬品

△ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。

1. 次の人は使用しないでください。(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2) ぜんそくを起こしたことがある人。(3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(4) 15歳未満の小児。2. 次の部位には使用しないでください。(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。(3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。3. 連続して2週間以上使用しないでください。

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。(1) 医師の治療を受けている人。(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、はれ、痛み、かゆみ、ヒリヒリ感、かぶれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック(アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

3.5~6日間使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。