

切り口 → → → 矢印の方向に引くと、手で簡単に切れます。 → → →

▼開封後はチャックを合わせ、密閉保存してください。

携帯に便利な

Hisamitsu®

10枚入

サイズ:10cm×14cm

薬袋包装!!

フェイタス® 5.0

フェルビナク配合テープ剤

大判サイズ

10cm×14cm



当社従来品に比べて
パッケージ(箱)を省き
紙の使用量を減らしました。

腰などの

痛み

直接浸透!

ビタミンE
配合

広い部位を
1枚でおおえる

微香性

セルフメディケーション
税 総額 対象

第2類医薬品

切り口 → → → 矢印の方向に引くと、手で簡単に切れます。 → → →

▼開封後はチャックを合わせ、密閉保存してください。

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、
必要なときにすぐ読めるように大切に保管してください。

経皮鎮痛消炎テープ剤 包装 10枚(10cm×14cm)
販売名:フェイタス®5.0 第2類医薬品

お客様
アンケート・
商品情報は
こちらへ▶



▼久光製薬の環境への取り組み
HELLO!eco!プロジェクトの
詳細はこちらへ。

<https://www.hisamitsu.co.jp>

特長

- 効きめ成分フェルビナクを5.0%配合した、経皮鎮痛消炎テープ剤。
- 微香性なので、就寝時や人前でも気になりません。
- 肩・腰・関節・筋肉の痛みに優れた効きめをあらわします。
- 全方位伸縮で、肌にピッタリフィットします。
- ビタミンE配合により、患部の血行を促進します。
- 腰などの広い部位を一枚でおおえる、大判サイズ。
- L-メントール3.5%配合で、さわやかな清涼感です。

使用上の注意

☒してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。]

- 次の人は使用しないでください。
(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2)ぜんそくを
起こしたことがある人。(3)妊婦又は妊娠していると思われる人。(4)15歳未満の小児。
- 次の部位には使用しないでください。
(1)目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。(3)みずむし・たむし等又は化膿してい
る患部。
- 連続して2週間以上使用しないでください。

相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
(1)医師の治療を受けている人。
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を
中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を
受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、 のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

- 5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この袋を持って医師、
薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、
又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

副作用被害救済制度
☎0120-149-931

製造 久光製薬株式会社
販売元 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地

お客様相談室: TEL.0120-133250

受付時間: 9:00~17:50 (土日・祝日・会社休日を除く)



4 987188 124468



2A83T

効能・効果

関節痛、筋肉痛、腰痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みとはれ)、肘の痛み(テニ
ス肘など)、打撲、ねんざ、肩こりに伴う肩の痛み

用法・用量

表面のフィルムをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。

〔用法・用量に関連する注意〕

(1)15歳未満の小児に使用させないでください。(2)定められた用法・用量を守
ってください。(3)本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するの
ではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ
使用してください。(4)汗をかいたり皮膚がぬれている時は、よくふき取って
から使用してください。(5)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇
所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等
の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

成分・分量 (膏体100g中)

フェルビナク 5.0g L-メントール 3.5g
トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE誘導体) 2.3g

添加物として、水添ロジングリセリンエステル、ステレン-イソブレン-スチレンブロック共重合体、
ステアリン酸亜鉛、BHT、ポリイソブチレン、流動パラフィン、その他1成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光や高温を避け、湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)
小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないで
ください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。(4)開封後は
チャックをしっかり閉めて保管してください。(5)使用期限(この薬袋に記載)
を過ぎた商品は使用しないでください。

製造番号

捺印範囲

使用期限